



すり傷、きり傷、かき傷、やけど、虫さされ、かゆみ、創傷面の殺菌・消毒、靴ずれ、痔疾時の肛門の消毒

#### 成分・分量 75mL中

ジブカイン塩酸塩 75mg・ナファソリン塩酸塩 75mg・クロルフェニラミンマレイン酸塩 150mg・ベンゼトニウム塩化物 75mg

#### 【使用上の注意】

【相談すること】 ●次の人は使

用前に医師、薬剤師又は登録販売者に

相談すること。●医師の治療を受けている人。

- ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ・患部が広範囲の人。
- ・深い傷やひどいやけどの人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

【用法・用量】 1日数回患部に噴霧又はガーゼ・脱脂綿に浸して塗布する。

【用法・用量に関する注意】 ●用法を守ること。●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。●目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。●外用にのみ使用すること。

【保管及び取扱い上の注意】 ●直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。●小児の手の届かない所に保管すること。●他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある) ●使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。(使用期限、製造番号は容器の底面に記載)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

寧葉化学工業株式会社

奈良県大和高田市旭南町2-25

<お問合せ先>

電話 0745-22-4151

9:00~16:00(土・日・祝日を除く。)

