

指定医薬部外品

ヴィメディカルドロップ

この箱の説明文書は、服用の際にはよくお読みください。

開
け
口

〈効能・効果〉 口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

〈用法・用量〉 大人(15歳以上)及び5歳以上の小児 1回2粒 1日3~6回 1粒ずつ2粒までを口中に含み、かますにゆっくり溶かして服用してください。2時間以上の間隔をおいて服用してください。なお、5歳未満の乳幼児は服用しないでください。

〔用法・用量に関する注意〕 (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(2) かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。

〈成分・分量〉 1日量(12粒)中

セチルピリジニウム塩化物水和物…6mg

添加物：グリセリン脂肪酸エステル、銅クロロフィリンNa、白糖、水アメ、l-メントール、香料、ベンジルアルコール

〈保管及び取扱い上の注意〉 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱の説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱の説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【お問い合わせ先】高市製薬株式会社 お客様相談室

0744-54-2514 (土・日・祝日を除く9:00~17:00)