

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

胃もたれ・胃痛

ロンターゼ®胃腸薬K顆粒

<制酸剤>

胃は非常にデリケートな臓器で、ストレスや過労、食生活の乱れなどに影響されやすく、早めのケアが大切です。

ロンターゼ胃腸薬K顆粒は、過剰な胃酸分泌を抑えて胃痛や胸やけを鎮めるとともに、荒れた胃粘膜を保護・修復し、さらに健胃生薬の莪朮・桂皮が胃腸機能を改善します。爽やかな香りと味の2顆粒剤で、胃もたれ、胃痛、胸やけなどの不快な胃腸症状によく効きます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。
透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないでください。

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6)次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
(7)次の診断を受けた人。
腎臓病、高血圧、心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2)5～6日間服用しても症状がよくなりえない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
口のかわき、便秘、下痢

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、胃もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ、胃痛

用法・用量

次の用法・用量を守り、食間又は食後に服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
15歳未満の小児	服用しないこと	

※食間とは食後2～3時間を指します。

成分・分量とはたらき

ロンターゼ胃腸薬K顆粒は、3包(4.5g)中に下記の成分・分量を含有します。

成 分	分 量	はたらき
アズレンスルホン酸ナトリウム (水溶性アズレン)	6mg	胃粘膜に作用して、炎症をしずめ、荒れた胃粘膜を修復します。
アルジオキサ	300mg	制酸作用を有するとともに、胃粘膜に作用して荒れた胃粘膜を修復・保護します。
グリチルリチン酸二カリウム	51mg	胃粘膜の炎症をしずめます。
合成ヒドロタルサイト	1,200mg	速やかで、しかも持続的な制酸作用があります。
炭酸水素ナトリウム	600mg	過剰な胃酸を中和します。
ロートエキス散 (ロートエキスとして)	300mg (30mg)	胃液の分泌を調節するとともに、胃の痛みをしずめます。
ガジュツ(莪朮)末	200mg	ショウガ科ガジュツの根茎で、芳香健胃薬として用いられています。
ケイヒ(桂皮)末	200mg	クスノキ科桂樹の樹皮で、芳香健胃薬として用いられています。

添加物として、トウモロコシデンプン、カルメロース、バレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ℓ-メントールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

日本製薬工業株式会社 お客様相談室 電話(0568)42-1234
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
<http://www.sg-nsk.co.jp>

製造販売元

日本製薬工業株式会社

愛知県小牧市小木東一丁目186