

胃もたれ・胃痛

ロンターゼ[®]胃腸薬K[®]顆粒

〈制酸剤〉

胃は非常にデリケートな臓器で、ストレスや過労、食生活の乱れなどに影響されやすく、早めのケアが大切です。

ロンターゼ胃腸薬K顆粒は、過剰な胃酸分泌を抑えて胃痛や胸やけを鎮めるとともに、荒れた胃粘膜を保護・修復し、さらに健胃生薬の莪朮・桂皮が胃腸機能を改善します。爽やかな香りや味の2顆粒剤で、胃もたれ、胃痛、胸やけなどの不快な胃腸症状によく効きます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。
透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないでください。



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。
腎臓病、高血圧、心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
口のかわき、便秘、下痢

■ その他の注意

母乳が出にくくなることがあります。

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、胃もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ、胃痛

用法・用量

次の用法・用量を守り、食間又は食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
15歳未満の小児	服用しないこと	

※食間とは食後2～3時間を指します。

成分・分量とはたらき

ロンターゼ胃腸薬K顆粒は、3包(4.5g)中に下記の成分・分量を含有します。

成分	分量	はたらき
アズレンスルホン酸ナトリウム (水溶性アズレン)	6mg	胃粘膜に作用して、炎症をしずめ、荒れた胃粘膜を修復します。
アルジオキサ	300mg	制酸作用を有するとともに、胃粘膜に作用して荒れた胃粘膜を修復・保護します。
グリチルリチン酸二カリウム	51mg	胃粘膜の炎症をしずめます。
合成ヒドロタルサイト	1,200mg	速やかで、しかも持続的な制酸作用があります。
炭酸水素ナトリウム	600mg	過剰な胃酸を中和します。
ロートエキス散 (ロートエキスとして)	300mg (30mg)	胃液の分泌を調節するとともに、胃の痛みをしずめます。
ガジュツ(莪朮)末	200mg	ショウガ科ガジュツの根茎で、芳香健胃薬として用いられています。
ケイヒ(桂皮)末	200mg	クスノキ科桂樹の樹皮で、芳香健胃薬として用いられています。

添加物として、トウモロコシデンプン、カルメロース、バレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、*l*-メントールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

日本製薬工業株式会社 お客様相談室 電話(0568)42-1234
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
<http://www.sg-nsk.co.jp/>

製造販売元

日本製薬工業株式会社
愛知県小牧市小木東一丁目186