

この説明文書は服用前に必ずお読み下さい。
また必要なとき読めるように保存しておいて下さい。

1

頭痛・肩こり痛・熱に

非ピリン系解熱鎮痛薬

(ビタミンB1配合)

セデス® V

シオノギ製薬

セデスVは、エテンザミド、アセトアミノフェンなどを配合することにより、すぐれた鎮痛・解熱効果をあらわします。さらに、鎮痛効果を助け発熱時などに消耗されるビタミンB1を、吸収のよい誘導体(塩酸ジセチアミン)として配合しています。頭痛・肩こり痛などの痛みに速く効き、胃にソフトな非ピリン系解熱鎮痛薬です。



使用上の注意 ……



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい

- (1) 本剤によるアレルギー症状をおこしたことがある人
- (2) 本剤または他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくをおこしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないで下さい (眠気があらわれることがあります)

4. 服用時は飲酒しないで下さい

5. 長期連用しないで下さい



相談すること



1. 次の人は服用前に医師、歯科医師または薬剤師にご相談下さい

- (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
- (3) 水痘(水ぼうそう)もしくはインフルエンザにかかっている、またはその疑いのある小児(15才未満)
- (4) 高齢者
- (5) 本人または家族がアレルギー体质の人
- (6) 薬によりアレルギー症状をおこしたことがある人
- (7) 次の診断を受けた人
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師または薬剤師にご相談下さい

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症状 |
|-------|------------|
| 皮ふ | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 恶心・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

| 症状の名称 | 症状 |
|--|--|
| ショック (アナフィラキシー) | 服用後すぐに、じんましん、浮腫、胸苦しさなどとともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさなどがあらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群 (ステイブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群) | 高熱をともなって、発疹・発赤、やけど様の水ぶくれなどの激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。 |
| 肝機能障害 | 全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)などがあらわれる。 |
| ぜんそく | |

(2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合



…… 効能・効果 ……

○頭痛・歯痛・月経痛（生理痛）・肩こり痛・神経痛・腰痛・外傷痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・筋肉痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛の鎮痛

○悪寒・発熱時の解熱

…… 用法・用量 ……

次の量なるべく空腹時をさせて、水またはぬるま湯でおのみ下さい。

また、おのみになる間隔は4時間以上おいて下さい。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|---------------|-----|----------|
| 成人（15才以上） | 2錠 | 3回を限度とする |
| 小児（7才以上15才未満） | 1錠 | |
| 乳幼児（7才未満） | | 服用させないこと |

●定められた用法・用量を厳守して下さい。

●小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

●錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているP.T.Pシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出しておのみ下さい。（誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながることがあります）



…… 成分・分量 ……

セデスVは、白色円形の錠剤で、1錠中に次の成分を含有しています。

| 成 分 | 含 量 | は た ら き |
|---------------------|-------|--|
| エテンザミド | 200mg | |
| アセトアミノフェン | 80mg | 熱を下げ、痛みをやわらげる |
| アリルイソプロピルアセチル尿素 | 30mg | 痛みをおさえる働きを助ける |
| 無水カフェイン | 40mg | 痛みをおさえる働きを助けるほか、頭痛をやわらげる |
| 塩酸ジセチアミン(ビタミンB1誘導体) | 4mg | 痛みをおさえる働きを助けるほか、発熱時などに消耗されるビタミンB1を補給する |

添加物としてカルメロースカルシウム、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

…… 保管および取扱い上の注意 ……

- (1) 直射日光の当らない湿気の少ない、涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) P.T.Pシートから出して他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり、品質が変化します)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないで下さい。



…… お問い合わせ先 ……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。

塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」

電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450

受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

…… 包 裝 ……

セデスV：10錠、30錠

®：登録商標

製造販売元

塩野義製薬株式会社

大阪市中央区道修町3丁目1番8号

①