

頭痛・肩こり痛・熱に

非ピリン系解熱鎮痛薬
(ビタミンB₁配合)

第2類医薬品

シオノギ製薬

セデス[®]V

セデスVは、エテンザミド、アセトアミノフェンなどを配合することにより、すぐれた鎮痛・解熱効果をあらわします。さらに、鎮痛効果を助け発熱時などに消耗されるビタミンB₁を、吸収のよい誘導体(ジセチアミン塩酸塩水和物)として配合しています。頭痛・肩こり痛などの痛みや熱に速く効き、胃にソフトな非ピリン系解熱鎮痛薬です。



使用上の注意 ……



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります)

- 1. 次の人は服用しないで下さい
 - (1) 本剤によるアレルギー症状をおこしたことがある人
 - (2) 本剤または他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくをおこしたことがある人
- 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
- 3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないで下さい (眠気があらわれることがあります)
- 4. 服用時は飲酒しないで下さい
- 5. 長期連用しないで下さい



相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師または薬剤師にご相談下さい
 - (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 水痘(水ぼうそう)もしくはインフルエンザにかかっている、またはその疑いのある小児(15才未満)
 - (4) 高齢者
 - (5) 本人または家族がアレルギー体質の人
 - (6) 薬によりアレルギー症状をおこしたことがある人
 - (7) 次の診断を受けた人
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師または薬剤師にご相談下さい
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	め ま い

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、じんましん、浮腫、胸苦しさなどとともに、 顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさなどが あらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱をともなって、発疹・発赤、やけど様の水ぶくれなどの 激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)などがあらわれる。
ぜんそく	

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合

…… 効能・効果 ……

- 頭痛・歯痛・月経痛（生理痛）・肩こり痛・神経痛・腰痛・外傷痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・筋肉痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛の鎮痛
- 悪寒・発熱時の解熱

…… 用法・用量 ……

次の量をなるべく空腹時をさけて、水またはぬるま湯でおのみ下さい。
また、おのみになる間隔は4時間以上おいて下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	2 錠	3回を限度とする
小児（7才以上15才未満）	1 錠	
乳幼児（7才未満）	服用させないこと	

- 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出しておのみ下さい。（誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながる可能性があります）



…… 成分・分量 ……

セデスVは、白色の錠剤で、1錠中に次の成分を含有しています。

成 分	含 量	は た ら き
エテンザミド	200mg	熱を下げ、痛みをやわらげる
アセトアミノフェン	80mg	
アリルイソプロピルアセチル尿素	30mg	痛みをおさえる働きを助ける
無水カフェイン	40mg	痛みをおさえる働きを助けるほか、頭痛をやわらげる
ジセチアミン塩酸塩水和物 （ビタミンB1誘導体）	4mg	痛みをおさえる働きを助けるほか、 発熱時などに消耗されるビタミンB1を補給する

添加物として カルメロースカルシウム、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

…… 保管および取扱い上の注意 ……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) PTPシートから出して他の容器に入れ替えないで下さい。
（誤用の原因になったり、品質が変化します）
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないで下さい。



…… お問い合わせ先 ……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。
塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450
受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について
（独）医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

…… 包 装 ……

セデスV：10錠、30錠

®：登録商標