

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

花粉やハウスダストなどによるアレルギー症状の緩和に

エゼットアルファ

目薬

【特徴】

- アレルギー専用の目薬*に、ハーブ生薬（カミツレ）由来の消炎成分（アズレンスルホン酸ナトリウム）と角膜保護成分（コンドロイチン硫酸ナトリウム）を新たに配合。
- 4つの有効成分がトータルに働いて、花粉やハウスダスト等によるアレルギー症状のつらい目のかゆみや充血、目の異物感を効果的に鎮めます。
- 刺激感を抑えた、ソフトでマイルドな差し心地。（清涼化剤は含まれていません）

（*抗アレルギー成分であるクロモグリク酸ナトリウムと、抗ヒスタミン剤のマレイン酸クロルフェニラミンを有効成分とするWアクションの目薬）



使用上の注意

してはいけないこと



（守らないと事故が起こりやすくなります）

- 点鼻薬と併用する場合には、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気があらわれることがあります）

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人。
- (3)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5)次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (6)次の診断を受けた人。
緑内障
- (7)アレルギーによる症状が他の原因による症状がはっきりしない人。
特に次のような場合は、アレルギーによるものとは断定できないため、使用前に医師に相談してください。
 - ・片方の目だけに症状がある場合
 - ・目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合
 - ・視力にも影響がある場合

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1)使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、痛み

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	使用后すぐに息苦しさ、浮腫（咽頭、まぶた、鼻粘膜、口唇等）、じんましん等の症状があらわれる。

- (2)目のかすみが改善されない場合
- (3)2日間使用しても症状がよくなる場合

3. 症状の改善がみられても、2週間を超えて使用する場合は、医師又は薬剤師に相談してください

（必ず裏面もお読みください）

K05

【効能・効果】

花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような目のアレルギー症状の緩和：目の充血、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）、なみだ目、異物感（コロコロする感じ）

【用法・用量】

1回 1～2滴、1日 4～6回点眼してください。

2日間使用しても症状の改善がみられない場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

＜用法や用量に関する注意＞

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(2)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。

(3)コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。

(4)点眼用にのみ使用してください。

(5)定められた用法、用量を守ってください。

(6)液色は、成分の色です。誤って衣服等に付着した場合には、水で洗い落としてください。

【成分】

成 分	分 量	はたらき
クロモグリク酸ナトリウム	1.0%	アレルギーの原因となる化学伝達物質の放出を抑制します。
マレイン酸クロルフェニラミン	0.015%	抗ヒスタミン作用により、アレルギー症状の目のかゆみ・充血を緩和します。
アズレンスルホン酸ナトリウム （水溶性アズレン）	0.02%	ハーブ生薬（カミツレ）由来の消炎成分で、充血やかゆみ等の炎症を効果的にしずめます。
コンドロイチン硫酸ナトリウム	0.2%	膜の透明性を維持し、角膜表層を保護します。

添加物として、ホウ酸、パラオキシ安息香酸プロピル、エデト酸ナトリウム、等張化剤及びpH調整剤を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

(2)小児の手のとどかない所に保管してください。

(3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）

(4)他の人と共用しないでください。

(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。

(6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとって使用してください。

(7)成分の水溶性アズレンは光線によって変化しやすい性質を有していますので、使用後は遮光袋に入れて保存してください。

(8)品質保持のため脱酸素剤が入っています。点眼薬をビニール袋から取り出した際には脱酸素剤を捨ててください。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室

TEL 03-3661-2080（ダイヤルイン）

月～金曜日 9:00～17:00（祝祭日を除く）



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11



K05

エーゼットアルファ