

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

ものもらい・結膜炎に

エーゼットTM抗菌目薬

〔特 徴〕

目は常に外界からの刺激にさらされており、非常に敏感に反応します。

エーゼット抗菌目薬は、細菌感染によって起こるものもらい、結膜炎などに効果があるスルファメトキサゾールと、炎症やかゆみを抑えるアズレンスルホン酸ナトリウム、マレイン酸クロルフェニラミンなどを配合した目薬です。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

●長期連用しないでください

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (5)次の診断を受けた人。
緑内障
- (6)サルファ剤によりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、悪心、発熱等）を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2)3～4日間使用しても症状がよくなる場合

〔効能・効果〕

ものもらい、結膜炎（はやり目）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、目のかゆみ

〔用法・用量〕

1回2～3滴、1日4～6回点眼してください。

(必ず裏面もお読みください)

〈用法や用量に関する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4)点眼用にのみ使用してください。
- (5)定められた用法、用量を守ってください。
- (6)液色は、成分の色です。誤って衣服等に付着した場合には、水で洗い落としてください。

〔成分〕

成 分	分 量	はたらき
スルファメトキサゾール	4.0%	持続性のサルファ剤で、細菌の感染で起こる眼病に効果を発揮します。
マレイン酸クロルフェニラミン	0.01%	抗ヒスタミン剤で、アレルギー性の目のかゆみを抑えます。
アズレンスルホン酸ナトリウム (水溶性アズレン)	0.02%	ハーブ生薬（カミツレ）由来の消炎成分で、充血やかゆみ等の炎症を効果的にしずめます。
コンドロイチン硫酸ナトリウム	0.3%	角膜細胞に働いて弱った目の生理機能の回復を助けます。

添加物として、ホウ酸、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル、エデト酸ナトリウム及びpH調整剤を含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとって使用してください。
- (7)成分の水溶性アズレンは光線によって変化しやすい性質を有していますので、使用後は遮光袋に入れて保存してください。
- (8)品質保持のため脱酸素剤が入っています。点眼薬をビニール袋から取り出した際には脱酸素剤を捨ててください。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室

TEL 03-3661-2080（ダイヤルイン）

月～金曜日 9:00～17:00（祝祭日を除く）

※「ものもらい」は、次のことを注意してください※

まぶたをこすったり、その他、目に刺激を加えないように注意してください。（なお、ものもらいは体質的に起こりやすい場合がありますが、過労や睡眠不足で体力が低下しているときに起こりやすいので疲労をさけ、睡眠を十分にとるよう心がけてください。）



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11



F06
エーゼット抗菌目薬