

# エネルギー代謝改善薬 **パニオン** コーワ錠

パニオンコーワ錠はアデノシン三リン酸二ナトリウム水和物(ATP)と4種のビタミンB群を同時配合していますので、血流を増加させ、低下したエネルギー代謝を高めます。従いまして、パニオンコーワ錠は年齢や体の変調などからくる身体各所の不快な症状(全身倦怠、しびれ、むくみ、めまい、食欲不振、心悸亢進)や、たまった疲れに改善効果をあらわします。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 高齢者。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
  - 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症 状                 |
|-------|---------------------|
| 皮ふ    | 発疹・発赤、かゆみ           |
| 消化器   | 悪心・嘔吐、食欲不振、胃腸障害、口内炎 |
| 精神神経系 | 頭痛、眠気、気分が落ち着かない     |
| その他   | 全身拍動感、耳なり、脱力感       |

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

- 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください  
便秘

## 効能・効果

- 疲労回復、脚気様症候群(全身倦怠、しびれ、むくみ、めまい、食欲不振、心悸亢進)及び脚気、熱性・消耗性疾患の補助療法
- 神経痛、腰痛、背痛、関節痛、関節炎、五十肩、肩こり

## 用法・用量

下記の量を服用してください。

| 年 齢       | 1回量     | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人(15歳以上) | 1錠      | 3回     |
| 15歳未満の小児  | 服用しないこと |        |

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 錠剤をかんだり、つぶしたりせずにそのまま服用してください。また、制酸剤又は牛乳と同時に服用しないでください。

## 成分・分量(3錠中)

| 成分・分量                                 | 働 き   |
|---------------------------------------|---|
| アデノシン三リン酸<br>二ナトリウム水和物 (ATP) 60.0mg   | 体のすみずみの血流を増加させ、<br>体内の代謝を活性化します。                |
| チアミンジスルフィド (V.B <sub>1</sub> ) 24.0mg | ビタミンB群が協力しあって働く<br>ことで、栄養素からのエネルギー<br>代謝を促進します。 |
| リボフラビン (V.B <sub>2</sub> ) 1.5mg      |   |
| ピリドキシン塩酸塩 (V.B <sub>6</sub> ) 24.0mg  |   |
| シアノコバラミン (V.B <sub>12</sub> ) 0.06mg  |   |

[添加物]ヒドロキシプロピルセルロース、硬化油、セルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、メタクリル酸コポリマーLD、ラウリル硫酸Na、ポリソルベート80、クエン酸トリエチル、タルク、酸化チタン、三二酸化鉄、カルナウバロウ

### <成分・分量に関連する注意>

本剤の服用により尿が黄色くなるがありますが、ビタミンB<sub>2</sub>(リボフラビン)によるものですから心配ありません。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 水分が錠剤につくと内容成分の変化のもととなるので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。
- (5) ビンのキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などにより、品質に影響を与える場合がありますので、服用のつどキャップをよくしめてください。
- (6) ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するために入れてあるので、キャップをあけた後は必ず捨ててください。
- (7) 使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないでください。



本製品に関するお問い合わせは

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566

電話受付時間：月～金（祝日を除く）9：00～17：00

