

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

和漢生薬便秘薬

ドクトルサン[®]

⚠【使用上の注意】

第②類医薬品

❌【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. **本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。**
他の瀉下薬（下剤）
2. **授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。**
3. **大量に服用しないでください。**

🗨️【相談すること】

1. **次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。**
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. **次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。**
(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- (2) 1週間位服用しても症状がよくならない場合
3. **次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。**
下痢

【効能・効果】

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲減退、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

【用法・用量】

次の量を添付の秤量さじで、1日1回空腹時に水又はお湯と一緒に服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

年 齢	1回量
大人(15歳以上)	1さじ(0.6g)～2さじ(1.2g)
15歳未満	服用しないこと

 左図の量で約0.6gです。

【用法・用量に関連する注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】1日量(1.2g)中

センナ末……750mg
添加物として酵母、ケイヒ、カンゾウを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

発 売 元
お問い合わせ先

株式会社 清王寺薬局
前橋市日吉町1-24-4
TEL 027-231-7213

製造販売元

松本製薬工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場160

M09-06