

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

# センナ配合 便秘／便秘に伴う諸症状の緩和 便秘薬 ドクトルサン®

第②類医薬品

## △ 使用上の注意

## ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。  
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
3. 大量に服用しないでください。

## ☒ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。  
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【効能・効果】

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲減退、腹部膨満、腸内異常醸酵、痔

## 【用法・用量】

次の量を添付の秤量さじで、1日1回空腹時に水又はお湯と一緒に服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しづつ增量又は減量してください。

年齢	1回量
成人(15歳以上)	1さじ(0.6g)～2さじ(1.2g)
15歳未満	服用しないこと



左図の量で  
約0.6gです。

## 【用法・用量に関する注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。

## 【成分・分量】 1日量(1.2g)中

センナ末………750mg

添加物として乾燥酵母、ケイヒ末、カンゾウ末を含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

株式会社 清王寺薬局

発 売 元

お問い合わせ先

前橋市日吉町1-24-4

電話 027-231-7213

製造販売元

日本製薬工業株式会社

愛知県小牧市小木東一丁目186