

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

軟膏とパウダーを兼ねた

第3類医薬品

アセモセーフ[®]

あせも、ただれに

®登録商標

アセモセーフはバレイショデンプン（32%）、酸化亜鉛（32%）が配合されているため塗布後パウダー状になり、湿潤した患部を乾燥させサラサラ感を与えます。アセモセーフに配合されている酸化亜鉛が皮ふを保護し、ジフェンヒドラミン、アミノ安息香酸エチルがかゆみ、痛み等の症状を緩和します。軟膏とパウダーの特徴をあわせもつあせもやただれに適した軟膏剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- ① 医師の治療を受けている人。
- ② 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- ③ 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ④ 湿潤やただれのひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- ① 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- ② 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

<効能・効果>

あせも、ただれ、かぶれ、かゆみ、皮膚炎、じんましん。

<用法・用量>

1日2～3回適量を患部に塗布してください。

用法・用量に関する注意

- ① 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ② 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- ③ 外用にのみ使用してください。

<成分・分量>

軟膏100g中

成 分	分 量	はたらき
ジフェンヒドラミン	1.0g	かゆみ等のアレルギー症状を緩和します。
アミノ安息香酸エチル	2.0g	痛み、かゆみ等を鎮めます。
酸化亜鉛	32.0g	皮ふを保護し、炎症を抑えます。

添加物：パラベン、フェノール、l-メントール、マクロゴール、バレイシヨデンブ、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

保管及び取り扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は次の所にお問い合わせください。
大昭製薬株式会社 おくすり相談室
電話 0748-88-4181
受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

製造販売元



大昭製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168