

口内炎・歯肉炎
歯槽膿漏薬

新デスパコー

口内炎はお口の粘膜にできた炎症性の病変で、その多くは潰瘍（粘膜組織の損傷）を伴います。

また、患部がしみて痛むといった不快症状を伴うことが多く、このような不快症状は少しでも早く治したいものです。

本剤をお使いになりますと、抗炎症作用のあるグリチルリチン酸二カリウム、殺菌作用のある塩化セチルピリジニウムとヒノキチオール、粘膜組織修復作用のあるアラントインとパンテノールといった3種類の有効成分が同時に患部に働いて、すぐれた効き目を発揮します。

さらに、本剤は歯ぐきの出血やはれなど歯肉炎・歯槽膿漏に伴う諸症状に対してもすぐれた効き目を発揮するように処方設計されているクリームです。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	味覚異常

- (2) しばらく使用しても症状がよくなる場合

用法・用量

口内炎	1日2～4回、適量を患部に塗布する。
歯肉炎・歯槽膿漏	1日2回（朝・晩）ブラッシング後、適量（約0.3g）を指にのせ、歯ぐきに塗擦する。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を守ること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 歯科用にのみ使用すること。
- (4) 約0.3gの目安量として、約1.5cmとり出して使用すること。

効能・効果

口内炎、歯肉炎・歯槽膿漏における諸症状（歯ぐきの出血・発赤・はれ・うみ・痛み・むずがゆさ、口のねばり、口臭）の緩和

成分・分量（1g中）

成分・分量		働 き
グリチルリチン酸二カリウム	4.0mg	殺菌作用により、患部の細菌汚染を防ぎます。
塩化セチルピリジニウム	0.5mg	
ヒノキチオール	1.0mg	
アラントイン	3.0mg	組織修復作用により、口内の粘膜組織を修復します。
パンテノール	3.0mg	

〔添加物〕マクロゴール、カルボキシビニルポリマー、グリセリン、流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、セタノール、ワセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ステアリン酸ソルビタン、パラベン、エデト酸Ca／2Na、水酸化Na、香料

保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 使用期限（外箱及びチューブに記載）をすぎた製品は使用しないこと。

容器の正しい使い方



キャップ上部の突起部でチューブの出し口（アルミシール）にしっかり穴をあけてお使いください。
＊使用後は必ずキャップをしっかりしめてください。

本製品に関するお問い合わせは

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566

電話受付時間：月～金（祝日を除く）9:00～17:00



製造 興和株式会社
販売元 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14