

-----ここからお切りください-----



△ チャック 開封後はチャックをしめて保管してください。

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

パスキネルテープ

第3類医薬品

[特長]

- パスキネルテープは、鎮痛・消炎作用を有するサリチル酸グリコールとI-メントールを配合し、肩こり、腰痛などにすぐれた効きめを発揮します。
- パスキネルテープは、柔軟性のある基布を使用していますので貼りやすく、粘着性にすぐれ関節部にもピッタリフィットします。

⚠ [使用上の注意]

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。

⚑ 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発 痒、発 赤、か ゆみ

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[効能・効果]

腰痛、打撲（うちみ）、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

[用法・用量]

表面のライナーをはがし、1日1~2回、患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発痒・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (3)患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭きとてからお貼りください。
- (4)皮膚の特に弱い人は、同じところには続けて貼らないでください。

[成分・分量]

膏体100g中に次の成分を含んでいます。

I-メントール 5.0g

サリチル酸グリコール 5.0g

添加物として流動パラフィン、脂環族飽和炭化水素樹脂、ボビドン、その他2成分を含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない温気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4)品質保持のため、未使用分はこの袋に入れ、開封口のチャックを閉めて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製品についてのお問い合わせは、下記にお願いいたします。

製造販売元 株式会社大石膏盛堂

佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

電 話 (0942)83-2112

受 付 時 間 午前9:00~午後5:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

