

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

腹痛を伴う下痢に

ストーゼ止瀉薬

ストーゼ止瀉薬は、細菌などのつくりだした毒素が腸内で作用するために起こる食あたり・水あたりや消化機能の低下、腸内異常発酵などによって起こる下痢・腹痛を伴う下痢などに良く効く止瀉薬で、腸機能の回復をたすけ改善をはかります。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

本剤又は牛乳によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある。)

4. 服用時は飲酒しないこと

5. 1週間以上継続して服用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

(1)医師の治療を受けている人。

(2)発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。

(3)急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。

(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがある。)

(4)妊婦又は妊娠していると思われる婦人。

(5)小児。(15才未満)

(6)高齢者。

(7)本人又は家族がアレルギー体質の人。

(8)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(9)次の症状のある人。

排尿困難

(10)次の診断を受けた人。

心臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1)服用後、次の症状が現れた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

(2)5～6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

□のかわき

その他の注意

母乳が出にくくなることもある

成分と働き 1日量12錠中

成 分	含 量	働 き
次没食子酸ピスマス	900mg	腸内異常発酵によってガスと結合し、腸への刺激を除く作用を有します。
タンニン酸アルブミン	1,110mg	腸内で加水分解されて腸内防腐収斂作用を現し、下痢に対し効果を示します。
アクリノール	120mg	いずれも抗菌力があり、食あたり、水あたりなどに対して効果があります。
タンニン酸ベルベリン	90mg	
ロートエキス	60mg	自律神経に作用して消化管の分泌抑制による止瀉及び腹痛を抑えます。

添加物としてヒドロキシプロピルセルロース・乳糖・ステアリン酸Caを含有します。

効能・効果

腹痛を伴う下痢、下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、軟便

用法・用量

下記の量を食後に服用して下さい。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15才以上）	4 錠	3 回
8 才以上15才未満	2 錠	
5 才以上 8才未満	1 錠	
5 才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3)錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲み下さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



保管及び取扱上の注意

- (1)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (2)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる)

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。
 カシマ薬品商事株式会社 名古屋営業所 電話フリーダイヤル0120-117-938
 受付時間：午前9時～午後5時まで（土、日、祝日を除く）

発売元



カシマ薬品商事株式会社
 佐賀県鹿島市古枝字天神甲470-12

製造
販売元

国産薬品工業株式会社
 岐阜市秋沢370番2