

綜合感冒剤

第2類医薬品

6 cap

かぜのねつ・せき・いたみに

かぜバン



日本医薬品製造株式会社

奈良県御所市古瀬18番地

かぜバン

販売名

かぜパン

医薬品

効能又は効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

用法及び用量

大人(15才以上) 1回1カプセル
1日3回、食後なるべく30分以内に服用する。

注 1. 次の人は服用しないこと。

- (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。

意 3. 服用に際しては、使用上の注意をよく読むこと。

4. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。

6カプセル(2日分) ¥800

配置期限

Lot



: 箱



: 成型シート
PTP

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、

副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乘物酔い薬、アレルギー用薬)

3. 服用後、眼気があらわれることがあるので乗物又は機械類の運転操作をしないでください。4. 服用時は飲酒しないでください。5. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人は。(4) 高齢者。(5) 本人又は家族がアレルギー体质の人。(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(7) 次の症状のある人。高熱、排尿困難 (8) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消化器	恶心・嘔吐、食欲不振	その 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーエンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあります。空せき、発熱時の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診察を受けること。)

ぜんそく

(2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合

3. 口のかわきがあらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

<用法及び用量に関する注意>

用法及び用量を厳守してください。

<保管及び取扱い上の注意>(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かないところに保管してください。
(3) 調用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。

(4) 配置期限の過ぎた製品は、服用しないでください。

製造販売元 日本医薬品製造株式会社

奈良県御所市大字古瀬18番地

お問い合わせ先 TEL 0745(67)0015