

この説明文書は使用前によくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

外用鎮痛・消炎擦剤

アイレンチック**本剤の特長**

- アイレンチックは、スティック状の外用鎮痛・消炎擦剤です。製剤的工夫でサリチル酸メチルなどの有効成分を固形にし、使いやすいプラスチック容器に収めました。
手を汚すことなく患部に直接すり込むことができます。
- アイレンチックは、吸収性のよいサリチル酸メチルや *l*-メントール、*dl*-カンフルなどの緩和な刺激作用で患部の血行を促進し、肩こり、筋肉痛、腰痛などの炎症を抑え、こりや痛みをやわらげます。

**使用上の注意****してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿しん、かぶれ、傷口。

相談すること

1. 次の方は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、使用を中止し、この説明文書を持って、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

適 応 症

肩こり、筋肉痛、腰痛、関節痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、骨折痛、しもやけ

(裏面へ続く)

用法・用量

通常、1日1～数回適量を患部に塗擦する。

＜容器の底部を押し上げて薬を4～5mm出し、患部にすり込んでください＞

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 目に入らないようご注意ください。万一目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4) 患部の汗をふき取ってから使用してください。
- (5) 容器が直接患部に当たらないように、容器の中の薬剤を4～5mm出してから使用してください。

成分・分量

成分名	100 g 中	作用
サリチル酸メチル	17.50 g	皮ふからの吸収がよく、炎症を抑え痛みをやわらげる。
l-メントール	6.00 g	さわやかな香りとともに、痛みやかゆみをやわらげる。
dl-カンフル	5.00 g	血行を促進して、痛みやかゆみをやわらげる。
グリチルレチン酸	0.02 g	抗アレルギー作用で炎症を抑える。

添加物としてイソプロパノール、グリセリン、ヒマシ油、ステアリン酸Na、香料を含有する。

保管および取扱上の注意

- (1) 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管してください。
- (2) 火気に近づけないでください。
- (3) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (4) 使用後は必ずキャップをきちんとしめてください。（揮発性のために薬剤がもろくなり、使用できなくなることがあります）
- (5) 合成樹脂、塗料（家具、塗装床、アクセサリなど）、化繊、絹、皮革などに付着すると変質することがあるのでご注意ください。
- (6) 使用期限の過ぎたものは使用しないでください。

包装

40 g × 50 本

問い合わせ先

アイレンチックについてのお問い合わせは、お買い求め先または下記のお客さま相談室までご連絡ください。

＜お客さま相談室＞ 〒176-8585 東京都練馬区豊玉北2-3-1 三笠製薬株式会社

TEL (03)3557-7272 （9時～12時、13時～17時／土・日・祝日を除く）

＜副作用被害救済制度の問合せ先＞ （独）医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）