

使用に際しては、この説明書をよく読んで、
理解してから正しく使うこと。
また、必要なときに読めるよう大切に保管すること。

第2類医薬品

殺虫剤

10

アーススミラブ発泡錠



1. ピリプロキシフェン

(IGR:昆虫成長制御剤) 配合

昆虫成長制御剤ピリプロキシフェンが、
蚊やハエの幼虫に作用して、成虫の出現を
抑えます。

2. 優れた安全性

哺乳類、魚類、その他有用動物に対する
安全性が確認されている薬剤です。

3. 高い拡散性

水中に処理すると炭酸ガスを発生しながら
溶け、隅々まで有効成分が拡散します。

⚠ 使用上の注意

注意－人体には使用しないこと

してはいけないこと

1. 薬剤を口や目に入れないこと。
2. 薬剤が人体に直接触れるおそれのある
場所には散布しないこと。
3. 小分けしたり、水で希釈したりするときは、
食品用の容器等、誤用のおそれのあるものを
利用しないこと。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録
販売者に相談すること。
 - (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (2) 薬や化粧品等によりアレルギー症状(発疹・
発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことが
ある人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この
説明書を持って医師、薬剤師又は登録
販売者に相談すること。
 - (1) 身体に異常をきたした場合
 - (2) 誤って薬剤を飲み込んだ場合

その他の注意

- 環境を汚染しないよう乱用を避けること。
また、養殖池、井戸、地下水などを汚染する
おそれのある場所や蜜蜂、蚕(桑)などに被害を
及ぼすおそれのある場所では使用しないこと。

- 食品、食器、おもちゃ、愛玩動物、飼料などは
あらかじめ他の場所に移すか、あるいは
格納し、薬剤がかからないようにすること。
- 希釈の際、直接手でかき混ぜるようなことは
しないこと。また、アルカリ性の下では分解
しやすいので、石けん液等の混入を防ぐこと。
- 希釈した液は不安定なので、その都度必要
量を調製し、使い切ること。また、直射日光の
下に放置しないこと。
- 薬剤の投入又は希釈液の散布にあたっては、
手袋、マスクなどを着け、薬剤を浴びない
ようにするとともに、できるだけ吸い込まない
ように注意すること。
- 使用した後、あるいは皮ふに付いたときは、
石けん水でよく洗い、口に入ったときには
水でうがいをすること。目に入った場合は、
直ちに水でよく洗い流すこと。
- 塗装面や合成樹脂の中には、薬剤によって
侵されやすいものがあるから注意すること。
- 希釈や散布に用いた器材は、石けん水で
洗い、よく手入れしておくこと。
- こぼした薬剤が、井戸等の飲料水水源に
流入した場合には、直ちに警察又は保健所に
届け出ること。
- 使用済みの空容器は適切に処分すること。

■効能又は効果

蚊幼虫(ボウフラ)、ハエ幼虫(ウジ)の防除

■用法及び用量

蚊幼虫 (ボウフラ)	流水域の場合、水量 1m^3 につき6～12錠(有効成分0.03～0.06ppm)を発生場所にそのまま投入する。 静止水域の場合、水量 1m^3 につき3錠(有効成分0.015ppm)を投入する。
ハエ幼虫 (ウジ)	水1Lに6～18錠を溶かし、希釈液を発生場所 1m^2 につき1Lを散布する。

- 定められた用法及び用量を厳守すること。

【蚊幼虫の防除に関する使用例】

雨水ます	縦110cm×横110cm×水深28cmの場合 1錠を雨水ますにそのまま投入してください。
植木鉢の受皿	直径25cm×水深2cmの場合 水20Lに1錠を投入し、錠剤が完全に溶けた後、60mLを植木鉢の受皿に注いでください。
側溝	幅30cm×深さ3cm、流速0.05m/秒(1時間あたり水量約 1.6m^3)の場合 9～20錠を側溝にそのまま投入してください。

※大きさや水深などにより適宜使用量を増減してください。

■成分及び分量

有効成分:1錠中ピリプロキシフェン(ジフェニルエーテル系)5mg

その他の成分:コハク酸、炭酸ナトリウム、他3成分

■保管及び取扱い上の注意

- 薬剤は開封したまま放置していると、空気中の水分を吸収して発泡力がおとろえるので、使用後残った薬剤は、元の袋に戻しチャックを閉じて箱に戻した後、他のものと区別して保管すること。
- 食品、食器、飼料などと区別し、小児の手の届かない乾燥した冷暗所に保管すること。

お問合せ先



Best Quality

製造販売元 大塚グループ XT
アース・バイオケミカル株式会社
〒771-0130 徳島市川内町加賀須野 923
(お客様窓口) フリーダイヤル 0120-810621
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

アースミラブ発泡錠 10

防疫用殺虫剤 第2類医薬品 昆虫成長制御剤

その他の注意

(1)定められた用法及び用量を厳守すること。(2)環境を汚染しないよう乱用を避けること。また、養殖池、井戸、地下水などを汚染する恐れのある場所や蜜蜂、蚕(桑)などに被害を及ぼす恐れのある場所では使用しないこと。(3)食品、食器、おもちゃ、愛玩動物、飼料などはあらかじめ他へ移すかあるいは格納し、薬剤がかからないようにすること。(4)希釈の際、直接手でかき混ぜるようなことはしないこと。また、アルカリ性の下では分解しやすいから、石けん液等の混入を防ぐこと。(5)希釈した液は不安定なので、その都度必要量を調製し、使い切ること。また、直射日光の下に放置しないこと。(6)薬剤の投入又は希釈液の散布にあたっては、手袋、マスクなどを着け、薬剤を浴びないようにするとともに、できるだけ吸い込まないように注意すること。(7)使用した後、あるいは薬剤が皮膚に付いたときは、石けん水でよく洗い、口に入ったときには水でうがいをする。また、目に入った場合は、直ちに水でよく洗い流すこと。(8)塗装面や合成樹脂の中には、薬剤によって侵されやすいものがあるから注意すること。また、濃厚希釈液の場合は植物にかかると枯れることがあるので注意すること。(9)希釈や散布に用いた器材は、石けん水で洗い、よく手入れをしておくこと。(10)こぼした薬剤が、井戸等の飲料用水源に流入した場合には、直ちに警察又は保健所に届け出ること。(11)使用済みの空容器は、適切に処分すること。

■保管及び取扱い上の注意

(1)薬剤は開封したまま放置していると、空気中の水分を吸収して発泡力がおとろえるので、使用後残った薬剤は、元の袋に戻し密閉した後、他のものと区別して保管すること。(2)食品、食器、飼料などと区別し、小児の手の届かない乾燥した冷暗所に保管すること。

注意-人体に使用しないこと

■使用上の注意

使用前に本記載内容をよく読み、十分理解した上で使用すること。

してはいけないこと

- (1) 薬剤を口や目に入れないこと。
- (2) 薬剤が人体に直接触れる恐れのある場所には散布しないこと。
- (3) 小分けしたり、水で希釈するときは、食品用の容器等、誤用の恐れのあるものを利用しないこと。

相談すること

- (1) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことのある人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。
- (2) 万一、身体に異常をきたした場合や誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに薬剤がジフェニルエーテル系の殺虫剤であることを医師に告げて診療を受けること。

防疫用殺虫剤 第2類医薬品 昆虫成長制御剤

アースミラブ発泡錠 10

- 有効成分:1錠中ピリプロキシフェン5mg 内容量:1g×400錠
- その他の成分:コハク酸、炭酸ナトリウム、他3成分
- 効能又は効果:蚊幼虫(ボウフラ)、ハエ幼虫(ウジ)の防除
- 用法及び用量

蚊幼虫 (ボウフラ)	流水域の場合、水量1m ³ につき6～12錠(有効成分0.03～0.06ppm)を発生場所にそのまま投入する。 静止水域の場合、水量1m ³ につき3錠(有効成分0.015ppm)を投入する。
ハエ幼虫 (ウジ)	水1Lに6～18錠を溶かし、希釈液を発生場所1m ² につき1Lを散布する。



製造販売元 大塚グループ
アース・バイオケミカル株式会社 TR
〒771-0130 徳島市川内町加賀須野923
(お問合せ先) TEL 088-665-5353

Lot.