

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

アレルギー性鼻炎、急性鼻炎などの

第2類医薬品

くしゃみ、鼻みず、鼻づまり スットース点鼻薬

急性鼻炎やアレルギー性鼻炎は、鼻みず、鼻づまりやくしゃみなどの不快な症状を呈します。

本品はスプレー式ですので、有効成分を鼻腔内に霧状に噴霧して鼻粘膜の炎症をおさえ不快な症状を改善します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

(2) 3日間位使用しても症状がよくなる場合


《効能・効果》

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり、鼻みず（鼻汁過多）、くしゃみ、頭重（頭が重い）

《用法・用量》

成人（15歳以上）及び7歳以上の小児：1回に1～2度ずつ、1日1～5回、鼻腔内に噴霧する。なお、適用間隔は3時間以上おくこと。

●ご使用方法



① キャップをとります。

② 容器をもち、液が噴霧するまで、はね部を2～3回押して下さい。

③ 静かに息を吸い込みながら、1～2度鼻腔内に噴霧して下さい。

《用法・用量に関連する注意》

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
- (4) 点鼻用にのみ使用し、内服しないで下さい。

《成分・分量》

成 分	分量100mL中	作 用
テトラヒドロゾリン塩酸塩	100 mg	鼻粘膜の血管を収縮させ、はれ、充血をとり、鼻づまりを改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	500 mg	抗ヒスタミン作用により、鼻みずの分泌過多をなくします。
リドカイン	500 mg	局所麻酔作用により痛みや不快感を取り除きます。
ベンゼトニウム塩化物	20 mg	鼻粘膜を殺菌・消毒します。

添加物：グリセリン、エタノール、pH調節剤、香料

《保管及び取扱い上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5) 表示の期限内にご使用下さい。なお、期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用下さい。

本剤についてのお問い合わせは、下記までご連絡下さい。

〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地

(株)雪の元本店 お客様相談室

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00

(土曜、日曜、祝日を除く)

TEL.0744-22-2440 FAX.0744-22-2406

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元



滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879

製造販売元

株式会社 雪の元 本店

奈良県橿原市大谷町182番地