

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

外用痔疾用薬

第2類医薬品

ヘモスカット坐薬

《ヘモスカット坐薬の特徴》

ヘモスカット坐薬は患部の炎症を抑えるヒドロコルチゾン酢酸エステル、痛みを鎮めるリドカイン、血行を改善するトコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)など、痔の治療に有効な5つの成分を配合しています。痔の痛み、かゆみ等に適した坐剤です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 患部が化膿している人。

2. 長期連用しないこと

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。


- (2) 10日間位使用しても症状がよくなりません

《効能・効果》

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

《用法・用量》

15歳以上：1回1個を肛門内に挿入する。なお、1日3回まで使用できる。



《用法及び用量に関連する注意》

- (1) 小児には使用させないでください。
- (2) 本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用してください。また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後に使用してください。
- (3) 肛門にのみ使用してください。

《成分・分量と作用》 本品 1個(1.65g)中

成 分	分量	作 用
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	5mg	患部の炎症をおさえ、はれ・かゆみを鎮めます。
リドカイン	50mg	患部の痛み、かゆみをおさえます。
酸化亜鉛	165mg	患部を保護し治癒を助けます。
トコフェロール酢酸エステル	30mg	血行を促進し、うっ血を防ぎます。
アラントイン	15mg	患部の組織を修復し、治りをはやめます。

(添加物としてハードファットを含有する)

《保管及び取扱い上の注意》

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(夏は冷蔵庫の中に保管してください。)
2. 小児の手の届かない所に保管してください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までご連絡ください。

〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地

株式会社 雪の元本店 お客様相談室

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00

(土曜、日曜、祝日を除く)

TEL 0744-22-2440 FAX 0744-22-2406

製造販売元 株式会社 雪の元本店

奈良県橿原市大谷町182番地