

ご使用に際し、この添付文書は必ずお読み下さい。  
また、必要な時にお読みになれるように大切に保管して下さい。

## 第3類医薬品

ビタミンB<sub>6</sub>配合

## 布田の目薬

目のかすみ・目の疲れ・目のかゆみに

目薬

15mL

私達の目はパソコン、ドライブ、ビジネス、テレビや花粉、ハウスダスト（室内塵）、大気汚染など毎日の生活環境において、さまざまなストレスをうけています。その結果、眼精疲労（目の疲れ）や目の不調（目のかすみ、目のかゆみ、充血）などが生じてしまいます。布田の目薬は目に栄養を与え、機能回復を促し、このような症状を効果的に改善する目薬です。



## 相談すること



## 【使用上の注意】

- 次の人は、使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
  - 医師の治療をうけている人
  - 本人又は家族がアレルギー体質の人
  - 薬によるアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 次の症状のある人  
はげしい目の痛み
  - 次の診断を受けた人  
緑内障
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
  - 使用后、次の症状があらわれた場合
 

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ
  - 目のかすみ改善されない場合
  - 2週間位使用しても症状がよくなる場合

## 【効能・効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

## 【用法・用量】

1回2～3滴、1日3～6回点眼してください。

## 【用法・用量に関する注意】

- 定められた用法、用量を守ってください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 容器の先が、まぶたやまつ毛などに触れると、目やにや雑菌などのため、薬液が汚染または混濁することがありますので注意してください。また、混濁したものは使用しないでください。
- ソフトコンタクトレンズの装着液として、またソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。ソフトコンタクトレンズが変質することがあります。
- 本剤は、点眼用에만使用してください。

成分・分量、保管及び取り扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。

**【成分・分量】**

有効成分	含有量 (100mL中)	はたらき
ベルベリン硫酸塩水和物	10mg	ふたつの成分の相乗効果により、炎症による目のかゆみ、充血などの症状を改善します。
グリチルリチン酸二カリウム	150mg	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	ヒスタミンの働きを抑え、目のかゆみを鎮めます。
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )	50mg	細胞の新陳代謝を促進し、疲れ目を改善します。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	250mg	角膜を保護し、目にうるおいをあたえるとともに、眼組織の働きを活性化させ、目の疲れを改善します。

添加物としてホウ酸、ホウ砂、*l*-メントール、*d*-ボルネオール、エデト酸ナトリウム水和物、グリセリン、クロロブタノール、メチルパラベン、プロピルパラベンを含有しています。

**【成分・分量に関する注意】**

本剤は点眼後、ときに口中に甘味を感じることがあります。これらは成分のひとつであるグリチルリチン酸二カリウムが、涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

**保管及び取り扱い上の注意**

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。また品質の保持のため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- (6)本剤の黄色は「ベルベリン」の色です。点眼の際、衣服などにつけないよう、十分にご注意ください。  
また点眼時、ティッシュを目の下に当ててお使いになることをお勧めします。
- (7)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽く拭き取ってください。

環境問題に配慮し、携帯袋は採用しておりませんので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

**お問い合わせ先**

佐賀製薬株式会社 お客様相談窓口  
 住 所：佐賀県三養基郡基山町小倉481  
 電 話：0942-92-5656 (代表)  
 受付時間：午前9:00～午後5:00 (土、日、祝日を除く)

発 売 元 **布田薬王寺**

〒283-0834 千葉県東金市上布田301

製造販売元 **佐賀製薬株式会社**

〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉481