

服用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

かぜ薬

第2類医薬品

# 新ベサエース小児用<sup>®</sup>



いちご味

新ベサエース小児用は、飲みやすい細粒（いちご味）のかぜ薬で、かぜによる発熱・せき・くしゃみ・鼻水・鼻づまり・頭痛・関節の痛み等の症状に効果をあらわします。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌【してはいけないこと】

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

#### 1. 次の人は服用しないで下さい

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい

（眠気があらわれることがあります）

#### 4. 服用時は飲酒しないで下さい

#### 5. 長期連用しないで下さい



### ■【相談すること】

#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 授乳中の人
- (4) 高齢者
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (7) 次の症状のある人：高熱、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人：甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

##### (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診察を受けること。)
ぜんそく	

##### (2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

#### 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい

口のかわき

## 【効能効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

## 【用法用量】

次の量を食後なるべく30分以内に服用して下さい。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
7才以上11才未満	1 包	3 回
3才以上7才未満	2/3 包	
1才以上3才未満	1/2 包	
1才未満	服用しないこと	

### ●用法用量に関連する注意

- (1) 用法用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させて下さい。

## 【成分分量】

1日量（3包）中

成 分	分 量	作 用
アセトアミノフェン	450mg	かぜによる発熱・のどの痛みをやわらげます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.75mg	鼻水・鼻づまり、くしゃみ等をおさえます。
チペビジンヒベンズ酸塩	30mg	せきの中枢に作用して、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	30mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
リポフラビン	3mg	傷ついた粘膜の修復を促すビタミンです。
カンゾウエキス末	36mg	炎症をしずめ、のどの痛みをやわらげます。

添加物としてアスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、D-マンニトール、ケイ酸Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、香料、エチルパニリン、バニリンを含有します。

### 【成分分量に関連する注意】

配合成分のリポフラビンにより、尿が黄色になることがあります。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 表示の期限内に服用して下さい。

●本剤には、生薬から抽出した成分が含まれておりますので、商品により多少細粒の色調が異なることがありますが、効果には変わりありません。

### <かぜの養生法>

- 食事は栄養に富み消化がよく、あたたかいものを心がけましょう。
- 部屋を暖かくし、乾燥に気をつけ、時々部屋の空気を入れ換えましょう。
- 汗をかいたら着衣を早く着替え、からだがかえないようにしましょう。
- 無理をせず、安静にし、体力を消耗しないようにしましょう。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



■お問い合わせ先  
滋賀県製薬株式会社 <すり相談室>  
電 話：(0748) 88-3180 (大代表)  
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元

