

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと
必要時に読めるように大切に保管すること

目のかわき・疲れ・かすみに
ティアリッチ目薬
涙液タイプの目薬

-----【ティアリッチ目薬の特徴】-----

1. 涙液タイプの目薬で、目のかわき、目の疲れ、目のかすみに効果をあらわします
2. コンタクトレンズを装着したまま点眼できます



コンタクトレンズを装着
したまま点眼できます



目のかわき

 【使用上の注意】



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人または家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
 - (5) 次の診断を受けた人
緑内障
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみが改善されない場合
- (3) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

〔効能〕

目の疲れ、涙液の補助（目のかわき）、ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ（目やにの多いときなど）

〔使用法〕

1回2～3滴、1日3～6回点眼してください

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください
また、混濁したものは使用しないでください
- (3) 点眼用에만使用してください

〔成分・分量〕

本剤は、無色澄明な液で、100mL中に次の成分を含有する

塩化ナトリウム 550mg

塩化カリウム 150mg

添加物：ハウ酸、ハウ砂、エデト酸ナトリウム水和物、ポリソルベート80、クロルヘキシジングルコン酸塩液、ヒドロキシエチルセルロース

〔保管および取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わる）
- (4) 他の人と共用しないでください
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後は速やかに使用してください
- (6) 自動車の中や暖房器具の近く等、高温（40℃以上）の所に置かないでください（容器が変形することがある）

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8

電話 03（6667）3232

受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋小網町1-8

製造販売元

日東メディック株式会社

富山県富山市八尾町保内1-14-1