

販売名:リポビタミンDⅡα

服用に際しては、説明書きをよく読んでください。

【使用上の注意】相談すること 1.次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください (1)服用後、次の症状があらわれた場合。皮ふ:発疹/消化器:胃部不快感 (2)しばらく服用しても症状がよくなる場合。

2.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください 下痢

【成分】100mL中

タウリン.....1000mg ビタミンB₁硝酸塩...5mg

ハゲキテン流エキス...0.2mL ビタミンB₂

(巴戟天200mgに相当) リン酸エステル...5mg

イノシトール.....50mg ビタミンB₆.....5mg

ニコチン酸アミド...20mg 無水カフェイン...50mg

添加物:白糖、D-ソルビトール、ステビア抽出精製物、ポビドン、安息香酸Na、クエン酸、クエン酸Na、香料、グリセリン、アルコール、バニリン (アルコール0.2mL以下)

【注 意】本剤の服用により、尿が黄色になることがあります。これは本剤中のビタミンB₂によるもので、ご心配ありません。

大正製薬(株)お客様119番室

電話 03-3985-1800

製造番号
使用期限

ガラス:瓶

金属:キャップ

★キャップと瓶は分別して捨ててください

医薬品

タウリン、ハゲキテン
ビタミンB₁・B₂・B₆配合

リポビタミンD

Ⅱα

100mL

大正製薬



株式会社²¹

東京都豊島区高田3丁目24番1号

【効 能】☆肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給 ☆滋養強壮 ☆虚弱体質

【用法・用量】成人(15才以上)1日1回1本(100mL)を服用してください。※15才未満は服用しないでください。

【注 意】(1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

DP2D



4