

第2類医薬品 リポビタミンDⅡα

服用に際しては、説明書きをよく読んでください。

【使用上の注意】 **相談すること** 1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。皮ふ：発疹／消化器：胃部不快感 (2) しばらく服用しても症状がよくなる場合。

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください 下痢

【成分】 100mL中 チアミン硝酸塩(ビタミンB1)・・・5mg
タウリン・・・・・・・・1000mg リボフラビンリン酸エステル
ハゲキテン流エキス・・・0.2mL ナトリウム(ビタミンB2)・・・5mg
(巴戟天200mgに相当) ピリドキシン塩酸塩

イノシトール・・・・・・・・50mg (ビタミンB6)・・・5mg
ニコチン酸アミド・・・20mg 無水カフェイン・・・・・・・・50mg
添加物：白糖、D-ソルビトール、ステビア抽出精製物、ポビドン、安息香酸Na、クエン酸、クエン酸Na、香料、グリセリン、アルコール、バニリン (アルコール0.2mL以下)

【注 意】 本剤の服用により、尿が黄色になることがあります。これは本剤中のビタミンB2によるもので、ご心配ありません。

大正製薬(株)お客様119番室
電話 03-3985-1800

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

製造番号
使用期限



ガラス：瓶
金属：キャップ
★キャップと瓶は分別して捨ててください

第2類医薬品

タウリン、ハゲキテン
ビタミンB1・B2・B6配合

リポビタミンD

Ⅱα

100mL

大正製薬  株式会社³¹

東京都豊島区高田3丁目24番1号

【効 能】 ☆肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給 ☆滋養強壮 ☆虚弱体質

【用法・用量】 成人(15才以上)1日1回1本(100mL)を服用してください。※15才未満は服用しないでください。

【注 意】 (1) 定められた用法・用量を厳守してください。(2) 本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。(3) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

DP6L

