

第2類医薬品 リポビタミンDIIα

服用に際しては、説明書をよく読んでください。

【使用上の注意】 相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って  
て医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

皮膚：発疹／消化器：胃部不快感

(2) しばらく服用しても症状がよくなる場合。

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような  
症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を  
中止し、医師又は薬剤師に相談してください 下痢

【用法・用量】 成人(15才以上) 1日1回1本  
(100mL)を服用してください。

※15才未満は服用しないでください。

【注 意】 (1) 定められた用法・用量を厳守し  
てください。(2) 本剤は生薬成分を含むため、  
まれに沈んで生じることがありますが、  
薬効には変わりありません。よく振ってから  
服用してください。

大正製薬(株)

お客様119番室

電話03-3985-1800

副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931

100mL

製造番号

使用期限

(西暦年月)

ガラス：瓶

金属：キャップ

★キャップと瓶は分別  
して捨ててください

第2類医薬品

滋養強壮・栄養補給

リポビタミンD

IIα



ハゲキテン

巴戟天

タウリン

ビタミン



大正製薬

株式会社<sup>11</sup>

東京都豊島区高田3丁目24番1号

【成分】100mL中

タウリン……………1000mg  
ハゲキテン流エキス……………0.2mL

(巴戟天200mgに相当)

イノシトール……………50mg

ニコチン酸アミド……………20mg

チアミン硝化物(ビタミンB1)……………5mg

リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)……………5mg

ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)……………5mg

無水カフェイン……………50mg

添加物：白糖、D-ソルビトール、ステビア抽出精製物、ポビドン、  
安息香酸Na、クエン酸、クエン酸Na、香料、グリセリン、アルコール、  
バニリン (アルコール0.2mL以下)

【注 意】 本剤の服用により、尿が  
黄色になることがあります、  
これは本剤中のビタミンB2に  
よるもので、ご心配ありません。

【効 能】 ☆肉体疲労・病中病後・  
食欲不振・栄養障害・発熱性消耗  
性疾患・妊娠授乳期などの場合の  
栄養補給 ☆滋養強壮 ☆虚弱体質

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい  
所に保管してください。(2) 小児の  
手のとどかない所に保管してくだ  
さい。(3) 使用期限を過ぎた製品  
は服用しないでください。

DP1A

