使用上の注意 **相談すること** 1.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師又は薬剤師に相談してください。 2週間位服用しても症状がよくならない場合。 過敏症 食欲不振、消化不良、胃弱、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、もたれ、胸つかえ、はきけ・嘔吐、消化不良による胃部・腹部膨満感

食欲不振・消化不良・胃弱・食べ過ぎ・飲み過ぎ・胸やけ・もたれ・胸つかえ・はきけ・嘔吐・消化不良による胃部・腹部膨満感

六光丸®

ろっこうがん

胃腸薬

第2類医薬品

謹製

元売販造製

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

副作用被害救済制度

電話：0120-149-931

1包(30粒)

品目番号
065-307

配置期限　製造番号　1包 ¥120

SS03

効 いずれも1日3回食後、お湯又は水で服用してください。3歳未満は服用しないでください。 (1)用法・用量を厳守してください。 (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。 (3)3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤のとにつかえることのないよう、よく注意してください。

細粒 1日量90粒中 センソリエキス0.1g (センソ0.9gに相当) オウバクエキス0.9g ケイヒ末1.0g ソウジュツ末0.3g カンゾウ末0.45g ソルビタンオキシコール酸3mg

添加物:薬梅粉、パルチョウ、澱粉糊、ステアリン酸

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 (2)小児の手の届かない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わります。) (4)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

使用上の注意 **相談すること** 1.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師又は薬剤師に相談してください。 2週間位服用しても症状がよくならない場合。 過敏症 食欲不振、消化不良、胃弱、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、もたれ、胸つかえ、はきけ・嘔吐、消化不良による胃部・腹部膨満感、腸鳴・腹部膨満感

効能・効果 胃腸虚弱、消化不良による胃部・腹部膨満感、食欲不振、胸やけ、もたれ、胸つかえ、はきけ・嘔吐、消化不良による胃部・腹部膨満感

用法・用量 成人(15歳以上) 1回30粒 11歳以上15歳未満 1回20粒
8歳以上11歳未満1回15粒 5歳以上8歳未満 1回10粒
3歳以上5歳未満 1回 7粒