

ご使用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

目薬

第2類医薬品

目のかゆみ、結膜充血に ラスター®ガード目薬

目は常に外界にさらされているため、アレルギー性の症状を起こしやすい器官のひとつです。特に近年、自然や生活環境の変化にともない、花粉やハウスダスト(室内塵)の飛散、大気汚染等が原因で起こるアレルギー性の目のかゆみ、結膜充血といった症状を訴える人があります。

ラスターガード目薬は、このような目のかゆみや充血を効果的に改善します。さらに、爽やかなさしごちで、目に清涼感を与えます。



使用上の注意



【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人
緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って 医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみが改善されない場合
- (3) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能効果】

目のかゆみ、結膜充血、眼瞼炎(まぶたのただれ)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

【用法用量】

1回1～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

＜用法用量に関連する注意＞

- (1)用法用量を厳守して下さい。
- (2)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (4)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (5)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (6)点眼用にのみ使用して下さい。



【成分分量】

100mL中

成 分	分 量	作 用
アラントイン	100mg	細胞の代謝を促進し、目の炎症や充血を鎮めたり、ただれを修復します。
グリチルリチン酸二カリウム	50mg	目の炎症を抑えたり、抗アレルギー作用により目のかゆみを取り除きます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみや充血を和らげます。
タウリン	500mg	炎症によって傷ついた目の組織修復を助け、眼病を予防します。
ナファゾリン塩酸塩	2mg	血管収縮作用により、目の刺激や疲れに伴う結膜充血を取り去ります。

添加物としてホウ酸、ホウ砂、塩化Na、L-メントール、d-ボルネオール、ゲラニオール、パラベン、クロロブタノール、エドト酸Na、ポリソルベート80を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近く等40℃以上になる場所に放置しないで下さい。(高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。)
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)他の人と共用しないで下さい。
- (5)表示の期限内にご使用下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室

電 話：(0748) 88-3180 (大代表)

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元



滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879