

LUSTER COOL 第3類医薬品

花粉・ほこり・目の汚れ

ラスター[®]クール 洗眼薬

抗ヒスタミン剤
抗炎症剤
配合

花粉やほこりを洗い流して
目、スツキリ。

COOL

500mL

目の洗浄・眼病予防 ラスター[®]クール洗眼薬

第3類医薬品

用法用量

1日3～6回、1回5mLを用いて洗眼して下さい。

洗眼法



①本剤を添付の洗眼カップの内側の線(5mL)まで入れます。

②顔を下に向けて、カップを目にぴったりと押しあて下さい。



③目にカップを押しあてたまま、液がこぼれないように上向き、数回まばたきをして洗眼して下さい。



〔用法用量に関連する注意〕

- (1)用法用量を厳守して下さい。
- (2)小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3)コンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (4)ご使用前に目のまわりの化粧や汚れはきれいにふきとって下さい。
- (5)洗眼カップは使用前後に水道水で十分に洗浄して下さい。
- (6)混濁したものは使用しないで下さい。
- (7)洗眼用にのみ使用して下さい。
- (8)片方の目を洗った薬液で反対側の目を洗わないで下さい。

目の洗浄・眼病予防 ラスター[®]クール洗眼薬

第3類医薬品

LUSTER COOL 第3類医薬品

目の洗浄・眼病予防 ラスター[®]クール 洗眼薬

タウリン
配合

コンタクトレンズを
はずした後の汚れた目に

500mL



4 974042 202516



登録商標

使用期限

製造番号

第3類医薬品



目の洗浄・眼病予防 ラスター[®]クール洗眼薬

●ご使用前に必ずお読み下さい●

⚠ 使用上の注意



■【相談すること】

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい
使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

効能効果

目の洗浄、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)

成分分量 100mL 中

イブシロン-アミノカブロン酸……………200mg
グリチルリチン酸二カリウム……………25mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩……………3mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)……………10mg
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)……………5mg
L-アスパラギン酸カリウム……………10mg
タウリン……………100mg
添加物としてホウ酸、ホウ砂、グリセリン、L-メントール、dl-カンフル、d-ボルネオール、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、塩化ベンザルコニウム、エデト酸Naを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 洗眼カップは他の人と共用しないで下さい。
- 表示の期限内にご使用下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室

電話：(0748) 88-3180(大代表)

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町湯879

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931