

ご使用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

目薬

目のかすみ・目の疲れに

第3類医薬品

ワイビー[®]40

目の酷使によって、近くのものが見づらい、文字がかすんで読みづらい、目が疲れやすい等の症状が現れてきます。

ワイビー40は、ピント調節機能を改善するネオスチグミンメチル硫酸塩や目の機能を活性化するビタミン、アミノ酸等の6つの有効成分を配合し、目のかすみや目の疲れ等の症状にすぐれた効果を現します。



使用上の注意



【相談すること】

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人
緑内障
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
 - (1) 目のかすみが改善されない場合
 - (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

【効能効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

【用法用量】

1回1～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

<用法用量に関連する注意>

- (1)用法用量を厳守して下さい。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
- (3)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (5)点眼用にのみ使用して下さい。



【成分分量】


100mL中

成 分	分 量	作 用
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	ピント調節機能改善作用により、目の疲れを改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	10mg	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみや充血を和らげます。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	50mg	目の新陳代謝を促進し、目の疲れや眼病予防に効果的に働きます。
酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	20mg	血行改善作用により、目への栄養補給を助けます。
タウリン	1000mg	目に栄養を与え、新陳代謝を促進し、目の疲れに効果的に働きます。
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	100mg	目の乾燥を防ぎ、眼病を予防します。

添加物としてホウ酸、ホウ砂、l-メントール、d-ボルネオール、セラニオール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エデト酸Na、クロロブタノール、塩化ベンザルコニウムを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近く等40℃以上になる場所に放置しないで下さい。
(高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。)
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)他の人と共用しないで下さい。
- (5)表示の期限内にご使用下さい。
(使用期限内であっても、開封後はなるべく早くご使用下さい。)



■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室

電 話：(0748) 88-3180 (大代表)

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元



滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879