

目 薬

アレルギー性症状等による

目のかゆみ・充血

ワイビー[®]AL

目は常に外界と接しているため、アレルギー性の症状を起こしやすい器官のひとつです。特に近年、自然や生活環境の変化にともない、花粉やハウスダスト（室内塵）等が原因で起こるアレルギー性の目のかゆみ、結膜充血といった症状を訴える人があります。



目のかゆみ



結膜充血



まぶたのただれ

⚠ 使用上の注意



【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人
 - はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人
 - 緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみ改善されない場合
- (3) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

【用法用量】

1回1～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

<用法用量に関連する注意>

- (1) 用法用量を厳守して下さい。
- (2) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (4) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (5) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (6) 点眼用にのみ使用して下さい。



【成分分量】


100mL中

成 分	分 量	作 用
塩酸ナファゾリン	2mg	目の刺激や疲れに伴う結膜充血を取り去ります。
マレイン酸 クロルフェニラミン	30mg	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみや充血をやわらげます。
グリチルリチン酸 ニカリウム	50mg	炎症を抑え、抗アレルギー作用があります。
アラントイン	100mg	目の傷やただれを修復します。
アミノエチルスルホン酸 (タウリン)	500mg	細胞の代謝を促して、炎症によって損傷した目の組織修復を助けます。

添加物としてホウ酸、ホウ砂、塩化Na、l-メントール、d-ボルネオール、ゲラニオール、パラベン、クロロブタノール、エデト酸Na、ポリソルベート80を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近く等40℃以上になる場所に放置しないで下さい。
(高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5) 表示の期限内にご使用下さい。



■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室

電 話: (0748) 88-3180 (大代表)

受付時間: 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879