

目薬

第2類医薬品

目の疲れ・充血 ワイビー®Vクール

1. 目の疲れを改善します。

ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）の新陳代謝促進作用が、目の
はたらきを活発にし、疲れた目の機能回復をたすけます。

2. 充血や目のかゆみをおさえます。

ナファゾリン塩酸塩が血管を収縮させ、結膜の充血をおさえます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩が炎症の原因となるヒスタミン
のはたらきをおさえ、目のかゆみや充血をやわらげます。

3. 眼病を予防します。

コンドロイチン硫酸エステルナトリウムは角膜の透明性を保ち、
表層を保護することにより目に潤いを与え、眼病も予防します。

4. クールなさしごちです。

疲れた目にクールな清涼感を与えます。



目の疲れ



結膜充血



目のかゆみ



使用上の注意



■【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して
下さい

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談して下さい

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入った
ときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶた
のただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目の
かゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

【用法用量】

1回1～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

<用法用量に関連する注意>

- (1)用法用量を厳守して下さい。
- (2)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (4)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (5)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (6)点眼用にのみ使用して下さい。



容器の先が目やまつ毛に触れないようにして下さい。

【成分分量】

100mL中

成 分	分 量	はたらき
ナファゾリン塩酸塩	3mg	血管収縮作用により、結膜充血をおさえます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	ピント調節機能改善作用により、目の疲れを改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	15mg	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみや充血をやわらげます。
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	100mg	新陳代謝を促進し、目の疲れをやわらげます。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	300mg	目の乾燥を防ぎ、眼病を予防します。

添加物として L-メントール、d-ボルネオール、ゲラニオール、ホウ酸、ホウ砂、エデト酸Na、クロロブタノール、パラベン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近く等40℃以上になる場所に放置しないで下さい。(高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。)
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)他の人と共用しないで下さい。
- (5)表示の期限内にご使用下さい。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用下さい。



■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
電 話：(0748) 88-3180 (大代表)
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元



滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町滝879