

2016年2月 効能変更に伴う改訂

この添付文書は、使用前によくお読みください。
なお、使用が終わるまで大切に保管してください。

せき・たん・喘鳴をともなうせきに

第②類医薬品

鎮咳去痰薬

六活AN錠
ロッカツ

六活AN錠は、気管支拡張作用（喘鳴をともなうせきに効果）および非麻薬性鎮咳作用を有するdl-メチルエフェドリン塩酸塩、せきに有効なナントンジツ乾燥エキス、たんに有効なグアヤコールスルホン酸カリウム、カンゾウ末、バイモ末、セキサンエキスが配合され、せき・たん・喘鳴（ぜいめい：ゼーゼー、ヒューヒュー）をともなうせきによく効く薬です。

△ 使用上の注意



してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります。)
- 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください



相談すること

- 次の人には服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、腎内障、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚(ふ)	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、眠気
- 5~6回服用しても症状がなくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

せき、喘鳴（ぜいめい：ゼーゼー、ヒューヒュー）をともなうせき、たん

—— 裏面もお読みください ——

【用法・用量】

次の量を1日3回食後服用してください。

年齢	1回量	年齢	1回量
15歳以上	2錠	5歳以上8歳未満	0.5錠
8歳以上15歳未満	1錠	5歳未満	服用しないでください

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)錠剤の取り出し方(PTP包装の場合)

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



【成分・分量と作用】

1日量(6錠)中

成 分	分 量	作 用
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支をひろげて、喘鳴をともなうせきをしめます。
サリチル酸ジフェンヒドラミン	81mg	ヒスタミンの遊離をおさえることによって、アレルギーによる喘鳴をともなうせき等に有効です。
無水カフェイン	150mg	脳の神経を興奮させて、眠気や倦怠感に効きます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	204mg	気道粘液の分泌をたかめ、粘りついているたんをうすめて、はき出しやすくします。
カンゾウ末	200mg	気道粘液の分泌をたかめ、たんをはき出しやすくします。また、炎症部の刺激を減少させ、せきをしめる作用もあります。
ナンテンジツ乾燥エキス (原生薬換算量: 1350mg)	135mg	知覚神経や運動神経の末梢に対してマヒ作用があり、喘鳴をともなうせきなどのせき止めに効果をあらわします。
セキサンエキス (原生薬換算量: 200mg)	25mg	二種類のアルカロイド「リコリン」と「セキサン」が含有され、たんをとる作用を有しております。
バイモ末	200mg	数種類のアルカロイドが含まれており、漢方として、せき止め、たん切り等の治療に用います。

添加物として、タルク、ステアリン酸Mg、クロスCMC-Na、バレイショデンプン、乳糖水和物、リボフラビンを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は生薬が配合されている製品ですので、製品によって錠剤の色が多少異なることがあります。また、錠剤の表面に斑点等が見られる場合がありますが、異物や変色ではなく生薬成分ですので効果には変わりありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して(瓶入り包装の場合)保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

T E L : 0748-52-2323

受付時間: 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824