



中国の民間説話「白蛇伝」
に登場する女性を伝統的な
漢方のイメージとしてシン
ボルマークとしたものです。

第2類医薬品

漢方製剤

トーガック[®]V「コタロー」

とう かくじょう き とう
(桃核承気湯エキス錠)

商品番号

S193

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

本剤は、漢方の古典「傷寒論^{しょうかんろん}」(後漢時代)収載の処方にもとづいてつくられたエキスを、飲
みやすく錠剤としたものです。

体力はかなりあるが、のぼせやすく便秘の傾向がある、また女性の場合、生理がつらいといっ
た状態に悩まされている方があります。

これらの方は漢方では瘀血^{おけつ}といって、体内の一種の血行障害によって起こると考えています。

トーガックVは、効能・効果にあるような瘀血症状をとるのに効果のある漢方薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4)胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5)高齢者。
 - (6)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (7)次の症状のある人。
むくみ
 - (8)次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中
止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受け
てください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱 力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強
が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者
に相談してください
下痢
4. 1ヵ月位(便秘に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は
服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
6. 本剤の服用により、予期しない出血があらわれた場合には、服用を中止し、この文書
を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

【効能・効果】

比較的体力があり、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症：

月経不順、月経困難症、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）。

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。

食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
大人（15歳以上）	4錠	3回
15歳未満5歳以上	3錠	
5歳未満	服用しないでください	

【用法・用量に関連する注意】

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

成分・分量（本剤12錠中）			
トウニン……………	3.33 g	ダイオウ……………	2.00 g
ケイヒ……………	2.67 g	カンゾウ……………	1.00 g
より抽出した水製エキス1.800 gを含有しています。			

添加物として酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、タルク、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ヒプロメロース、粉末飴、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カラメル、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。

（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）

(4) ぬれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。水分は錠剤の色や形が変わる原因になります。


(5) ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で錠剤の品質が変わることがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。

(6) ビンの中の詰めものは、フタをあけた後はすててください。

（詰めものは、輸送中に錠剤が破損することを防ぐためのものですので、再使用されると異物の混入や湿気により品質が変わる原因になることがあります）

(7) 使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。

(8) 箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。



湿気注意

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室

大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106

受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

®登録商標

製造販売元



漢方をよりよく より多くの人に

小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号

TEL 06 (6371) 9106