

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。



漢方製剤

トーキン®「コタロー」

(とうきいんし
当帰飲子エキス錠)

商品番号

S195

本剤は、漢方の古典「^{さいせいほう}濟生方」収載の処方にもとづいてつくられたエキスを、飲みやすく錠剤としたものです。

老年になると皮膚が乾燥気味になって、かゆみを訴えることがよくあります。

また、老齢の方でなくても空気が冷えて乾燥してくる季節、皮膚がカサカサした傾向になったり、かゆみに悩まされる方も近年増えています。

これらは漢方では^{けっきょ}血虚（^{けつ}滋潤・栄養のはたらきをする血の不足）に伴って起こっていると考えますが、トーキンは分泌物の少ない湿疹、かゆみをおさえるお薬です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください

下痢

【効能・効果】

冷え症のものの次の諸症：

慢性湿疹（分泌物の少ないもの）、かゆみ。

（裏面につづく）

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。

食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
大人（15歳以上）	4錠	3回
15歳未満7歳以上	3錠	
7歳未満5歳以上	2錠	
5歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。



【成分・分量】

成分・分量（本剤12錠中）			
トウキ……………2.50 g	シャクヤク……………1.50 g	センキュウ……………1.50 g	
ボウフウ……………1.50 g	ジオウ……………2.00 g	ケイガイ……………1.00 g	
オウギ……………1.00 g	カンゾウ……………0.50 g	シツリシ……………1.50 g	
カシュウ……………1.25 g			
より抽出した水製エキス3.00 gを含有しています。			

添加物として酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、タルク、ヒドロキシプロピルメチルセルロース2910、粉末飴、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カラメル、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- (4) 水分が錠剤に付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5) 湿気などにより薬が変質することがありますので、服用後は、ビンのフタをよくしめてください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



【包装】

180錠

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室

大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106

受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元



漢方をよりよく より多くの人に

小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号

TEL 06 (6371) 9106