

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。

アイエース (ビタミンB1主薬製剤)

使用上の注意【相談すること】 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること／皮ふ：発疹／消化器：吐き気、嘔吐、胃部不快感 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること／軟便、下痢 3.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

成分・分量 1日量[100mL(50mL×2)]中 ベンフォチアミン40mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)12mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)50mg、ニコチン酸アミド60mg、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム900mg、オキシアミジン末(加工大蒜)50mg 添加物：液糖、D-ソルビトール、ハチミツ、pH調節剤(クエン酸)、安息香酸Na、香料(エチルパニリン、パニリン、エタノール、プロピレングリコール) ●ビタミンB2により尿が黄色くなることがある。**効能・効果** ○次の諸症状の緩和：眼精疲労、神経痛、筋肉痛、関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘

**ベンフォチアミン
コンドロイチン**

アイエース

眼精疲労



肩こり



**関節痛
神経痛**



第3類医薬品

常盤薬品
NOEVIR GROUP

品目番号 奈良181-303

○脚気「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
○次の場合のビタミンB1の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時 **用法・用量** 成人(15才以上)1日2回、1回1びん(50mL)を服用すること。
●用法・用量を守ることを。保管および取扱上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。) (4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)生薬を含むため、まれに混濁を生じることがありますが、服用には支障はありません。

製造販売元
常盤薬品工業株式会社
大阪市中央区安土町3-5-12
NOEVIR GROUP

お問い合わせは
☎0120-875-710まで
www.kusuribako.jp

副作用被害救済制度
☎0120-149-931



056103
KSB304

配置期限

製造番号

50mL 300円(税別)

金属：キャップ ガラス：びん