

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
必要ときに読めるように、大切に保管してください。

第2類医薬品

ストップチン

(せき止め薬)

「せき」は、異物や分泌物を体外へ排出して身体を守ろうとする、生体にとって有益な反射運動です。しかし、せきがげしくなると体力の消耗を招いたり、安静や睡眠が妨げられたりして、病気の回復を遅らせることとなります。

ストップチンは、せきの中枢に働いてせきをしずめるジヒドロコデインリン塩酸塩と、気管支をひろげるdl-メチルエフェドリン塩酸塩を配合していますので、せきとたんに効果をあらわします。

特長

- ・せきに効果のある鎮咳剤ジヒドロコデインリン塩酸塩を配合
- ・配合成分がせきの中枢と気管支の両方に作用し、せきとたんに効果をあらわす

 使用上の注意

 してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
- ※1. 次の人は服用しないでください
12才未満の小児。
 - 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など）
 - 3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください
(眠気などがあらわれることがあります。)
 - 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を
さけてください
 - 5. 過量服用・長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮ふや粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿などがあらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛みなどがあらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさなどがあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

効能・効果

せき、たん



用法・用量

1日3回毎食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	 1 包	3回 朝  昼  夜 
12才以上15才未満	 2/3包	
12才未満	✕ 服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量 1日量(3包)中 1包1,000mg

成分	分量	はたらき
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せきの中樞に働いて、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支をひろげて、せきをしずめ呼吸を楽にします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	抗ヒスタミン作用により、アレルギー性のせきをしずめます。
無水カフェイン	150mg	せき・たんをおさえる働きを助けます。

添加物：乳糖、パレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース

〈保管および取扱い上の注意〉

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせは
常盤薬品工業株式会社
お客さま相談室0120-875-710まで
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度0120-149-931

常盤薬品工業株式会社
NOEVIR GROUP
本社
神戸市中央区港島中町6-13-1
製造販売元
三重県伊賀市白樫字永谷2604-5