

モーリンホワイト

項目	内容
医薬品区分	配置用医薬品
薬効分類	かぜ薬(内用)
承認販売名	
製品名	モーリンホワイト
製品名(読み)	モーリンホワイト
製品の特徴	かぜの諸症状には、発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、関節の痛み、筋肉の痛みなどがあります。モーリンホワイトは、これらの症状に有効な各種の成分を配合した総合かぜ薬です。 解熱作用のある動物性生薬のゴオウと地竜をはじめ、抗炎症作用のある植物性生薬のカンゾウ、非ピリン系解熱鎮痛剤、鎮咳剤、気管支拡張剤、抗ヒスタミン剤、ビタミン剤などを配合し、かぜの諸症状の緩和にすぐれた効果をあらわします。 特長 ● 解熱作用生薬のゴオウと地竜を配合 ● のどの痛みなどの炎症を抑えるカンゾウを配合 ● かぜにより消耗したビタミンB1を補給 ● 胃粘膜保護剤を配合
使用上の注意	■ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります) - 次の人は服用しないでください (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2) 本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 (3) 12才未満の小児。 - 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬) - 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください(眠気などがあらわれることがあります。) - 授乳中の人は服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください - 服用前後は飲酒しないでください - 長期連用しないでください ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5) 次の症状のある人。

高熱、むくみ、排尿困難

(6) 次の診断を受けた人

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

[関係部位: 症状]

皮膚: 発疹・発赤、かゆみ

消化器: 吐き気・嘔吐、食欲不振

精神神経系: めまい

泌尿器: 排尿困難

その他: 過度の体温低下

まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

[症状の名称: 症状]

ショック(アナフィラキシー): 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。

皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症: 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がないなどが持続したり、急激に悪化する。

肝機能障害: 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる。

間質性肺炎: 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

偽アルドステロン症: 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

ぜんそく: 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しいなどがあわれる。

再生不良性貧血: 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿などがあらわれる。

無顆粒球症: 突然の高熱、さむけ、のどの痛みなどがあ

	られる。 腎障害：発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢などがあらわれる。 呼吸抑制：息切れ、息苦しさなどがあらわれる。 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください 便秘、口のかわき、眠気 4.5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください																																
効能・効果	かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和																																
効能関連注意																																	
用法・用量	毎食後なるべく30分以内に服用してください。 [年齢：1回量：1日服用回数] 成人（15才以上）：2カプセル：3回 12才以上15才未満：1カプセル：3回 12才未満：服用しないでください。																																
用法関連注意	（1）用法・用量を厳守してください。 （2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。 （3）カプセルの取り出し方 カプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりしますと食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）																																
成分分量	<table><tr><td colspan="3">6カプセル中</td></tr><tr><td>成分</td><td>分量</td><td>内訳</td></tr><tr><td>カンゾウエキス末</td><td>142.86mg</td><td>（原生薬換算量1000mg）</td></tr><tr><td>ゴオウ末</td><td>3mg</td><td></td></tr><tr><td>地竜乾燥エキス</td><td>129mg</td><td>（原生薬換算量993.3mg）</td></tr><tr><td>ベンフォチアミン（塩酸チアミン誘導体）</td><td>10mg</td><td></td></tr><tr><td>アセトアミノフェン</td><td>600mg</td><td></td></tr><tr><td>クロルフェニラミンマレイン酸塩</td><td>7.5mg</td><td></td></tr><tr><td>ジヒドロコデインリン酸塩</td><td>24mg</td><td></td></tr><tr><td>dl-メチルエフェドリン塩酸塩</td><td>60mg</td><td></td></tr></table>			6カプセル中			成分	分量	内訳	カンゾウエキス末	142.86mg	（原生薬換算量1000mg）	ゴオウ末	3mg		地竜乾燥エキス	129mg	（原生薬換算量993.3mg）	ベンフォチアミン（塩酸チアミン誘導体）	10mg		アセトアミノフェン	600mg		クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg		ジヒドロコデインリン酸塩	24mg		dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	
6カプセル中																																	
成分	分量	内訳																															
カンゾウエキス末	142.86mg	（原生薬換算量1000mg）																															
ゴオウ末	3mg																																
地竜乾燥エキス	129mg	（原生薬換算量993.3mg）																															
ベンフォチアミン（塩酸チアミン誘導体）	10mg																																
アセトアミノフェン	600mg																																
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg																																
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg																																
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg																																

	<table><tr><td>無水カフェイン</td><td>75mg</td><td></td></tr><tr><td>酸化マグネシウム</td><td>140mg</td><td></td></tr></table>	無水カフェイン	75mg		酸化マグネシウム	140mg	
無水カフェイン	75mg						
酸化マグネシウム	140mg						
添加物	バレイショデンプン, 炭酸カルシウム, ステアリン酸カルシウム, ゼラチン, 酸化チタン, ラウリル硫酸Na, ステアリン酸マグネシウム						
保管及び取扱い上の注意	(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 (2)小児の手のとどかない所に保管してください。 (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。) (4)期限を過ぎた製品は服用しないでください。						
消費者相談窓口	会社名:常盤薬品工業株式会社 問い合わせ先:お客さま相談室 電話:0120-875-710 受付時間:9:00～17:00(土, 日, 祝日を除く)						
製造販売会社	常盤薬品工業(株) 会社名:常盤薬品工業株式会社 住所:大阪府中央区安土町3-5-12						
販売会社	(株)太陽薬品						
剤形	カプセル						
リスク区分等	第「2」類医薬品						