

第②類医薬品

この説明書は、本剤とともに保管し、
服用の際には、必ずお読みください。

Ⓐ1

のみやすく、
溶けやすい顆粒タイプ

葛根湯加桔梗エキス配合 かぜ薬

新エスタック顆粒

NEW S. TAC GRANULES

葛根湯加桔梗エキス配合のかぜ薬

新エスタック顆粒は、かぜの諸症状に有効な洋薬成分と、古くから「かぜ」に用いられてきた葛根湯に桔梗を加えた「葛根湯加桔梗エキス」を配合したかぜ薬で、さむけ（悪寒）、頭痛、くしゃみ、鼻水などの症状によく効きます。
新エスタック顆粒は、のみやすく、溶けやすい顆粒タイプです。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。）

1. 次の方は服用しないでください
(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
（眠気があらわれることがあります。）
4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
5. 服用時は飲酒しないでください
6. 長期連用しないでください

■ 相談すること

1. 次の方は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)高齢者。(4)本人又は家族がアレルギー体質の人。(5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6)次の症状のある人。高熱、排尿困難(7)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、糖尿病、緑内障、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、甲状腺機能障害、フェニルケトン尿症
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、 顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の 激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等 があらわれる。

症状の名称	症状
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けてください。)
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

便秘、口のかわき

効能・効果

かぜの諸症状(発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用します。

年 齢	成人 (15才以上)	11才～ 14才	7才～ 10才	3才～ 6才	1才～ 2才	1才未満
1回量	1包	2/3包	1/2包	1/3包	1/4包	服用しないこと

＜用法・用量に関連する注意＞(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(3)2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

成分と作用

新エスタック顆粒は、1包(2.0g)中に次の成分を含んでいます。

成 分	1包中	作 用
葛根湯加桔梗エキス [カッコン 0.53g、マオウ 0.27g、 ケイヒ 0.2g、シャクヤク 0.2g、 タイノウ 0.27g、ショウキョウ 0.07g、 カンゾウ 0.13g、キキョウ 0.27g の煎液より製したエキス]	1,000mg	古くから「かぜ薬」として知られる葛根湯にせきをしずめる桔梗を加えた処方のエキスです。発熱、悪寒、頭痛、筋肉痛、それにせき、のどの痛みに効果をあらわします。
アセトアミノフェン	240mg	熱を下げ、痛みをしずめます。
ジヒドロコデインリン酸塩	5mg	せきをしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.5mg	鼻水・くしゃみなどのアレルギー症状をおさえます。
無水カフェイン	25mg	頭痛をしずめます。

添加物として、CMC-Ca、無水ケイ酸、ゼラチン、乳糖、白糖、デンプン、トウモロコシデンプン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、バニリン、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。(5)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

<http://www.ssp.co.jp/>