

【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

**新エスタック顆粒**

第②類医薬品

かぜ薬 葛根湯加桔梗エキス配合 のみやすく、溶けやすい顆粒タイプ

- 新エスタック顆粒は、かぜの諸症状に有効な洋薬成分と、古くから「かぜ」に用いられてきた葛根湯に桔梗を加えた「葛根湯加桔梗(かっこんとうかききょう)エキス」を配合したかぜ薬で、さむけ(悪寒)、頭痛、くしゃみ、鼻水などの症状によく効きます。
- 新エスタック顆粒は、のみやすく、溶けやすい顆粒タイプです。

**⚠ 使用上の注意****⊗ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)**① 次の人は服用しないでください**

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3)12才未満の小児。

**② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください**

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等)

**③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください**

(眠気等があらわれることがあります。)

**④ 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください****⑤ 服用前後は飲酒しないでください****⑥ 長期連用しないでください****相談すること****① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)高齢者。
- (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5)次の症状のある人。高熱、排尿困難
- (6)次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症、フェニルケトン尿症

**② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

関係部位	症状
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。

(表面のつづき)

症状の名称	症状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をすときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
便秘、口のかわき、眠気
- ④ 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 効能・効果

かぜの諸症状(発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

### 用法・用量

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	成人(15才以上)	12才～14才	12才未満
1回量	1包	2/3包	×服用しないこと

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。  
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

### 成分

1包(2.0g)中

葛根湯加桔梗エキス…1,000mg

〔カッコン0.53g、マオウ0.27g、ケイヒ0.2g、シャクヤク0.2g、  
タイソウ0.27g、ショウキョウ0.07g、カンソウ0.13g、キキョウ  
0.27gの煎液より製したエキス〕

アセトアミノフェン……………240mg

ジヒドロコデインリン酸塩……………5mg

クロルフェニラミンマレイン酸塩…2.5mg

無水カフェイン……………25mg

添加物：カルメロースCa、無水ケイ酸、ゼラチン、乳糖、白糖、テンパン、トウモロコシテンパン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、バニリン、香料

### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
(2)小児の手の届かない所に保管してください。  
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)  
(4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。  
(5)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

### お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。  
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 電話0120-028-193  
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒163-1488 東京都新宿区西新宿3-20-2

https://www.ssp.co.jp/