

服用に際しては、説明書きをよく読んでください。

タウリン、巴戟天、ビタミン B₁・B₂・B₆配合

リポビタンD PRO

リポビタンD PRO

第2類医薬品



【使用上の注意】

相談すること



1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
皮膚：発疹／消化器：胃部不快感
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
3. しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効 能】

☆肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給 ☆滋養強壮 ☆虚弱体質

【用法・用量】

成人（15 歳以上）1 日 1 回 1 本（100mL）を服用してください。

※15 歳未満は服用しないでください。

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

【成 分】 100mL 中

タウリン	1000mg
ハゲキテン流エキス	0.2mL（巴戟天 200mg に相当）
イノシトール	50mg
ニコチン酸アミド	20mg
チアミン硝化物（ビタミン B ₁ ）	5mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミン B ₂ ）	5mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミン B ₆ ）	5mg
無水カフェイン	50mg

添加物：白糖、D-ソルビトール、ステビア抽出精製物、ポビドン、安息香酸 Na、クエン酸、クエン酸 Na、香料、グリセリン、アルコール、バニリン（アルコール 0.2mL 以下）

【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミン B₂によるもので、ご心配ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

大正製薬(株) お客様 119 番室
電話 03-3985-1800

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

大正製薬  株式会社³¹
東京都豊島区高田3丁目24番1号

——本文は、直接ラベルに記載されている事項です——