

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

NIDファーマシーパップEX



【特徴】

- NIDファーマシーパップEXは、さわやかな香りのする鎮痛・消炎冷感パップ剤です。
- NIDファーマシーパップEXは、炎症や痛み及び血行促進に効果のある有効成分が皮膚から吸収されて、すぐれた効きめを発揮します。
- NIDファーマシーパップEXは、鎮痛・消炎効果のある生薬成分(オウバク軟エキス、サンシシ軟エキス)を配合しています。
- NIDファーマシーパップEXは、粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、はがれやすい部位にもピッタリフィットします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと

- (1)目の周囲、粘膜等。 (2)湿疹、かぶれ、傷口。

🗨 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、腰痛、しもやけ、骨折痛

【用法・用量】 表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1～2回貼付する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
- (4)皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。
(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。)

【成分・分量】 膏体100g (875cm²) 中

サリチル酸グリコール……1.0 g オウバク軟エキス………0.7 g
l-メントール………1.0 g (原生薬換算量2.31g)
dl-カンフル ……0.5 g サンシシ軟エキス………0.33g
トコフェロール酢酸エステル…0.3 g (原生薬換算量1.0g)
添加物として、ゼラチン、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸Na、尿素、エドト酸Na、カオリン、酸化チタン、pH調整剤、その他3成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管すること。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- (5)衣服に付着すると黄色に着色することがあるので、付着しないように注意すること。

販売名 NIDファーマシーパップEX

【包装】 24枚入 [6枚入×4袋]
(1枚: 10cm×14cm)

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
帝國製薬株式会社 お客様相談室
電 話 (0879)25-2363
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

副作用被害救済制度
☎0120-149-931



4 987373 062117

ここを押して
開けて下さい。