

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

NIDファーマシーパップ<ホット>

第3類医薬品



【特 徴】

- NIDファーマシーパップ<ホット>は、鎮痛・消炎効果と温感作用をあわせもった弱酸性の温感パップ剤です。
- NIDファーマシーパップ<ホット>は、サリチル酸メチル、グリチルリチン酸などの鎮痛・消炎成分に、トウガラシエキスを配合していますので、患部の血行を良くし、心地よい温熱感で腰痛、肩こりなどの痛みを緩和します。
- NIDファーマシーパップ<ホット>は、粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ピッタリフィットします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3.5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 腰痛、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、しもやけ、骨折痛

【用法・用量】 表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1～2回貼付する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 打撲(うちみ)、捻挫には、はれがひいてから使用すること。

- (4) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
- (5) 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないこと。
- (6) 本剤を貼ったまま、あるいは剥がした直後に入浴しないこと。
(強い刺激を感じることがあるので、少なくとも入浴の1時間前には剥がし、入浴後は30分位してから使用すること。)
- (7) 本剤に触れた手で、目の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜にさわらないこと。
- (8) 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。
(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。)

【成分・分量】 本品膏体100g (875cm²) 中

サリチル酸メチル …… 1.0g グリチルリチン酸 …… 0.03g
dl-カンフル …… 0.5g トウガラシエキス …… 0.22g
(原生薬換算量2.75g)

添加物として、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリアクリル酸、エデト酸Na、カオリン、pH調整剤、その他3成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管すること。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

【包装】 12枚入 [6枚入×2袋]

(1枚: 10cm×7cm)

【販売名】 NIDファーマシーパップ<ホット>

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
帝國製薬株式会社 お客様相談室
電 話 (0879)25-2363
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

副作用被害救済制度
☎0120-149-931



ここを押して
開けて下さい。

