

使用に際してこの説明文書をよく読むこと。また、必要なときに読めるよう大切に保管すること。

ここを押して開けて下さい

**【特徴】**  
ケアルラパッチは、かゆいところにペタンと貼るだけで、かゆみをおさえるパッチです。かき傷も防げます。

### △使用上の注意

**⊗してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



#### 相談すること

- 次の人は使用前に医師 薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感、色素沈着

- 5~6日間使用しても症状がよくなる場合使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**【効能・効果】** 虫さされ、かゆみ、しもやけ

**【用法・用量】** パッチをライナーからはがし、1日数回患部に貼付する。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 外用にのみ使用すること。
- (4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用すること。
- (5) 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。

**【成分・分量】** 膏体 100g 中

クロタミトン ..... 5.0g      ジフェンヒドラミン ..... 1.0g  
 リドカイン ..... 2.0g      イソプロピルメチルフェノール ..... 1.0g  
 添加物として、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、ハイシスポリイソブレンゴム、BHTを含む。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと折り曲げて保管すること。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

**【包装】** 24枚入(直径3cmの円形)



〈お問い合わせ先〉  
 本品についてのお問い合わせは、  
 お買い求めのお店又は下記に  
 お願い致します。  
 帝國製薬株式会社 お客様相談室  
 電話(0879) 25-2363  
 受付時間  
 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

販売名 **第2類医薬品**  
ケアルラパッチ



帝國製薬株式会社  
香川県東かがわ市三本松567番地

4 987373 078903