

この添付文書は本剤とともに保管し、
服用に際しては必ずお読みください。

どうき・息切れ

強心薬
丸製剤

百寿 六神丸

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります)
本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで
ください
他の強心薬



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って
医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなりえない場合

〔成分・分量〕 1日量4丸(1丸17.5mg)中

牛 黄	3mg	沈香末	8mg
蟾 酥	5mg	動物胆	5mg
人參末	9mg	d-ボルネオール	7mg
鹿茸末	12mg		

添加物：寒梅粉、デヒドロ酢酸Na、バレイショデンプン、薬用炭

〔効能・効果〕 動悸・息切れ・気付け

〔用法・用量〕

大人(15才以上) 1回2丸
1日2回白湯又は水で服用してください。
服用間隔は6時間以上おいてください。

《用法及び用量に関連する注意》

- (1) かまずに服用してください。
- (2) 用法・用量を厳守してください。15才未満の小児
には服用させないでください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に
密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

美吉野製薬株式会社「お客様相談係」

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

〒638-0842 奈良県吉野郡大淀町大岩692

TEL (0745) 67-0144 (代)

美吉野製薬株式会社 奈良県吉野郡大淀町大岩692

0303SA