

回数
目安(回)

●10
●
●20
●
●30
●
●40
●
●50
●
●60
●
●70

— 速乾性すり込み式手指消毒剤 —

ピュアミスト® 手指の殺菌・消毒

使用開始

月

日

第3類医薬品

250 mL

MICROSHIELD®
Skincare Products

Johnson & Johnson K.K.

製品コード
11200

うるおい
成分配合

LIPIDURE®
mixture

Puremist®



適量を手にとり
手指全体に
まんべんなくすり込み
乾燥させてください。

残量
目安 (mL)

●
●
●
●
●
●200●
●
●
●
●
●150●
●
●
●
●
●
●100●
●
●
●
●
●50●



使用後、空容器を図
のようにして折り目
に沿って押しつぶし
てください。
(つぶした後は元
に戻りません。)



ボトル：PE
キャップ：PP
ラベル：PE
ポンプ：PP
ポンプ袋：PE

火気厳禁

アルコール類
(エタノール)
危険等級Ⅱ 水溶性

使用に際しては、下記の説明書きをよく読んでください。

△ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと。
(1) 損傷のある皮膚 (2) 目の周囲、粘膜等

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能又は効果】 手指の殺菌・消毒

【用法及び用量】 本剤の適量をそのまま手指に塗布し、乾燥するまで摩擦する。

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 用法及び用量を厳守すること。(2) 血液や汚物などが付着している場合には、石鹸でよく洗浄後、使用すること。(3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(4) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(5) 外用にのみ使用し、服用しないこと。

【成分及び分量】

本剤 100mL 中 ペンザルコニウム塩化物 0.2g

添加物：エタノール、イソプロパノール、
ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、
2-メタクリロイルオキシエチルホスホリ
ルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体
(リビジュア®)、その他 2成分を含む。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かないところに保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4) 火気に近づけないこと。(5) 本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場合があるので注意すること。(6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

お問い合わせ先：

ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社
TEL.03-4411-7908

受付時間：9:00-17:00 (土・日・祝祭日は除く)

発 売 元：ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社
〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2

製造販売元：日油 株式会社
〒150-6019 東京都渋谷区恵比寿4-20-3

使用期限・製造番号は、容器底面に記載しております。

「リビジュア」は日油株式会社の登録商標です。022D ©登録商標 ©J&JKK



手指消毒手順

残量目安(mL)



1 適量を手にとり、
初めに両手の指
先(爪)によくす
り込みます。



2 次に手のひら・
甲によくすり込
みます。



3 指の間や親指に
もすり込みます。



4 手首も忘れずに
すり込みます。

火気厳禁

アルコール類(エタノール)
危険等級Ⅱ 水溶性

使用期限・製造番号は、
容器底面に記載しております。

第3類医薬品

MICROSHIELD®
Skincare Products

—速乾性すり込み式手指消毒剤—

ピュアミスト®

手指の殺菌・消毒

使用開始

月

日

うるおい
成分配合



Puremist®



適量を手にとり
手指全体に
まんべんなくすり込み
乾燥させてください。

500 mL

Johnson & Johnson K.K.

製品コード
11201

Puremist®

回数目安
(回)

- 30
- 40
- 50
- 60
- 70
- 80
- 90
- 100
- 110
- 120
- 130

使用に際しては、下記の説明書きをよく読んでください。

△ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 次の部位には使用しないこと。
(1) 損傷のある皮膚 (2) 目の周囲、粘膜等

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能又は効果】手指の殺菌・消毒

【用法及び用量】本剤の適量をそのまま手指に塗布し、
乾燥するまで摩擦する。

<用法及び用量に関連する注意>

(1) 用法及び用量を厳守すること。(2) 血液や汚物などが付着している場合には、石鹸でよく洗浄後、使用すること。(3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(4) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(5) 外用にのみ使用し、服用しないこと。

【成分及び分量】

本剤 100mL 中 ベンザルコニウム塩化物 0.2g
添加物: エタノール、イソプロパノール、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン、メタクリル酸ブチル共重合体(リビジュア®)、その他2成分を含む。



ボトル: PE
キャップ: PP
ラベル: PE
ポンプ: PP
ポンプ袋: PE

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かないところに保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4) 火気に近づけないこと。(5) 本剤はアルコールを含有しているため床にごぼれると変色する場合があるので注意すること。(6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先:

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

使用後、空容器を図のよう
にして折り目を外側に押し
つぶしてください。
(つぶした後は元に戻りま
せん。)



お問い合わせ先:

ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社

TEL.03-4411-7908

受付時間: 9:00-17:00 (土・日・祝祭日は除く)

発 売 元:

ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社

〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2

製造販売元:

日油 株式会社

〒150-6019 東京都渋谷区恵比寿4-20-3

「リビジュア」は日油株式会社の登録商標です。

022D ㊞登録商標 ©J&J&K

手指消毒手順



1 適量を手にとり、初めに両手の指先(爪)によくすり込みます。



2 次に手のひら・甲によくすり込みます。



3 指の間や親指にもすり込みます。



4 手首も忘れずにすり込みます。

火気厳禁 アルコール類(エタノール) 危険等級Ⅱ 水溶性

使用期限・製造番号は、容器底面に記載しております。

MICROSHIELD®
Skincare Products

第3類医薬品

— 速乾性すり込み式手指消毒剤 —

ピュアミスト®

手指の殺菌・消毒

使用開始

月

日

うるおい
成分配合



Puremist®



適量を手にとり
手指全体に
まんべんなくすり込み
乾燥させてください。

1 L

Johnson & Johnson K.K.

製品コード
11202

Puremist®

使用に際しては、下記の説明書きをよく読んでください。

△ 使用上の注意
してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 次の部位には使用しないこと。
(1) 損傷のある皮膚 (2) 目の周囲、粘膜等

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能又は効果】手指の殺菌・消毒

【用法及び用量】本剤の適量をそのまま手指に塗布し、乾燥するまで摩擦する。

<用法及び用量に関連する注意>

(1) 用法及び用量を厳守すること。(2) 血液や汚物などが付着している場合には、石鹸でよく洗浄後、使用すること。(3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(4) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(5) 外用にのみ使用し、服用しないこと。

【成分及び分量】本剤 100mL 中 ベンザルコニウム塩化物 0.2g

添加物：エタノール、イソプロパノール、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体(「リビジュア®」、その他2成分を含む。



4 987482 112024



ボトル：PE
キャップ：PP
ラベル：PE
ポンプ：PP
ポンプ袋：PE

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かないところに保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) 火気に近づけないこと。(5) 本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場合があるので注意すること。(6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先：
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

使用後、空容器を図のよう
にして折り目を外側に押し
つぶしてください。
(つぶした後は元に戻りま
せん。)



お問い合わせ先：

ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社
TEL.03-4411-7908

受付時間：9:00-17:00 (土・日・祝祭日は除く)

発 売 元：ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社
〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2

製造販売元：日油株式会社
〒150-6019 東京都渋谷区恵比寿4-20-3

「リビジュア」は日油株式会社の登録商標です。
022D ®登録商標 ©J&JKK