

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

「クラシエ」漢方桂枝茯苓丸料加薏苡仁エキス錠

(ケイシブクリョウガンリョウカヨクニン)

特 徴

- 「桂枝茯苓丸料加薏苡仁」は、「桂枝茯苓丸」に皮膚のあれなどによく使われる薏苡仁（ハトムギ）を加えた処方です。
- のぼせや冷えを伴う月経不順、しみ、にきびなどに効果があります。
- のみやすいフィルムコート錠です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

下痢

効 能

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：しみ、にきび、手足のあれ、月経不順、血の道症



しみ、にきび



月経不順

用法・用量

次の量を1日2回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	4錠	2回
15才未満7才以上	3錠	
7才未満5才以上	2錠	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分

成人1日の服用量8錠（1錠342mg）中、次の成分を含んでいます。
桂枝茯苓丸料加薏苡仁エキス粉末 …………… 1,800mg
〔ケイヒ・ブクリョウ・ボタンピ・トウニン・シャクヤク各2.0g、
ヨクイニン5.0gより抽出。〕

添加物として、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、セルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、カルナウバロウを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
（ビン包装の場合は、密栓して保管してください。なお、ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますので捨ててください。）
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- (5) 水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。
- (6) 4錠分包の場合、1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日をすぎた場合には服用しないでください。



健康アドバイス

●睡眠は大切



十分な睡眠をとるようにしましょう。
この間に栄養が皮膚に補給され、老廃物が排出されます。夜寝ている間に新しい表皮細胞が生まれ、皮膚の修復に役立ちます。

●規則正しい生活を



朝食を抜いたり、夜遅く飲食をしないで、1日3食規則正しい食生活を心がけましょう。無理なダイエットも体のバランスをくずします。



生理の一週間ほど前から足腰を温めるようにしましょう。血行をよくすることで生理の痛みも和らぎます。体を冷やさないように工夫することが大切です。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発売元

クラシエ薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元

クラシエ製薬株式会社

東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)