

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

マツ[®]

ワカ末漢方便秘薬錠

漢方処方〈調胃承氣湯〉

特徴

- 「ワカ末漢方便秘薬」は、漢方の古典といわれる中国の医書「傷寒論」ショウカンロンに収載されている漢方処方「調胃承氣湯」チョウイジョウキトウにもとづいた製剤です。
- 慢性および急性の便秘に対して、おだやかに、すぐれた排便効果があります。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起これやすくなります)

- 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬（下剤）
- 2.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊娠又は妊娠していると思われる人
- (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
- (4)胃腸が弱く下痢しやすい人
- (5)高齢者
- (6)次の症状のある人
むくみ
- (7)次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病

- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

- 4.1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- 5.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能

体力中等度なもの次の諸症：

便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでのもの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満、腸内異常酵素・痔などの症状の緩和



（裏面につづきます）

用法・用量

次の量を1日2回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	3錠	2回
15才未満7才以上	2錠	
7才未満5才以上	1錠	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分

成人1日の服用量6錠(1錠300mg)中、次の成分を含んでいます。

調胃承気湯エキス粉末 1,100mg
〔ダイオウ2.5g、カンゾウ1.0g、乾燥硫酸ナトリウム0.5gより
抽出。〕

添加物として、ステアリン酸Mg、クロスCMC-Na、二酸化ケイ素、アルファーハイ化デンプン、セルロースを含有する。

〈成分に関する注意〉

- (1)本剤に含まれるダイオウにより、尿が橙色ないし、赤色になることがあります。
- (2)本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(ビン包装の場合は、密栓して保管してください。なお、ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますので捨ててください。)
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- (5)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。
- (6)3錠分包の場合、1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管してください。なお、2日をすぎた場合には服用しないでください。



健康アドバイス

●食事はバランスよく



毎日の便通は健康のバロメーターです。食べ過ぎや偏食を避け、バランスのとれた食事を心がけましょう。特に食物繊維が多く含んだ野菜、芋類、豆類、根菜類などをとりましょ。

●適度な運動をしましょう



適度な運動は、血液循環を高めて腸の働きを活性化します。スポーツは、心地よい肉体疲労とともに、ストレス解消にもつながります。

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシ工 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334

受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発 売 元

クラシ工 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元

クラシ工 製薬株式会社

東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)