

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

痔の痛み、かゆみ、はれ、出血に
ヘモスカット軟膏
外用痔疾用薬

ヘモスカット軟膏は…

- ・痔の炎症やはれに優れた効果をあらわすヒドロコルチゾン酢酸エステルを配合しています。
- ・つらい痛みを抑える局所麻酔薬のジブカイン塩酸塩、細菌感染を防ぐクロルヘキシジン塩酸塩、傷ついた組織を修復するアラントインなどを配合しておりますつらい症状に早く効きます。
- ・皮膚への刺激が少ない軟膏剤ですので、敏感な方でもご使用になれます。

**使用上の注意****してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 患部が化膿している人。

2. 長期連用しないこと**相談すること****1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること**

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
そ の 他	刺激感、化膿

3. 10日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

《効能・効果》

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

《用法・用量》

1日3回、適量を肛門部に塗布してください。

《用法及び用量に関する注意》

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。
- (2) 肛門部にのみ使用すること。

《成分・分量と作用》 本品100g中

成 分	分 量	主 な 働 き
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.20 g	炎症、はれを抑えます。
ジブカイン塩酸塩	0.30 g	痛み、かゆみを抑えます。
フェニレフリン塩酸塩	0.15 g	患部の出血を抑えます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	0.50 g	かゆみをしづめます。
クロルヘキシジン塩酸塩	0.20 g	細菌の感染をおさえ、患部の悪化を防ぎます。
トコフェロール酢酸エステル	1.00 g	血行を改善し、うっ血を防ぎます。
アラントイン	0.80 g	傷ついた組織を修復します。

(添加物として、サラシミツロウ、スクワラン、流動パラフィン、ワセリンを含有する。)

《保管及び取扱い上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)



《治療のアドバイス》

- 硬い便は肛門に傷をつけたり、出血や脱肛の原因となりますから、食事に注意し、便秘にならないように心がけてください。
- ぬれたガーゼで拭く、こまめに入浴をするなど、患部を常に清潔に保つように心がけてください。
- 座る、かがむなど患部にうっ血を起しやすい姿勢を長く続けないでください。
- お酒や香辛料の入った食べ物、タバコなどはなるべくさけるようにしてください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までご連絡ください。

〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地
株式会社 雪の元本店 お客様相談室
受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
(土曜、日曜、祝日を除く)
TEL 0744-22-2440 FAX 0744-22-2406

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元 株式会社 雪の元 本店

奈良県橿原市大谷町182番地