

この説明文書は服用前に必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

生薬の便秘薬 ウェストン[®]W錠

ウェストンW錠は、弱った腸のぜん動運動を活発にしてお通じをよくし、腸を正常に保つセンナ・大黃・牽牛子と芍薬・甘草を配合した生薬の便秘薬です。

ウェストンW錠は、便秘の改善とともに、便秘に伴う頭痛やのぼせ、肌あれなどにも効果を発揮します。

ウェストンW錠をおやすみ前に服用されれば翌朝（作用が現れる時間には、個人差がありますが通常7～10時間後を目安）に効果が現れます。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
3. 大量に服用しないこと

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、悪心・嘔吐
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- (2) 1週間位服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合は、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢

効 能

○便秘 ○便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常酸酵、痔

用法・用量

次の量を、水又はぬるま湯で服用して下さい。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15才以上)	2～3 錠	1 日 2 回を限度とし、なるべく空腹時に服用して下さい。 服用間隔は 4 時間以上おいて下さい。 ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量して下さい。
11才～14才	1～2 錠	
11才未満	服用しないで下さい。	

- ・ 用法・用量を厳守して下さい。
- ・ 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- ・ 作用が現れる時間には個人差がありますが、本剤を空腹時に服用されれば通常7～10時間後（おやすみ前に服用されれば翌朝）に効果が現れます。

成分・分量 1錠中

成分名	分量	作用
センナ末	215mg	腸粘膜を刺激して便通を促します。
ダイオウ乾燥エキス	22mg (大黃 78.6mgに相当)	
ケンゴシ(牽牛子)末	20mg	
シャクヤク乾燥エキス	13.3mg (芍薬 93.2mgに相当)	排便時の腹痛などの不快な症状を和らげます。
カンゾウ乾燥エキス	12mg (甘草 93.8mgに相当)	

添加物:CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、ステアリン酸Ca、ケイ酸A1、セルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、マクロゴール、カルナバロウ

- ・本剤に配合されているセンナ末及びダイオウ乾燥エキスにより、尿が黄褐色又は赤色になることがあります。
- ・本剤の成分には生薬及び生薬エキスが含まれていますので、製品により錠剤の色調が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、フタをあけた後は捨てして下さい。
- (5) 使用期限をすぎた製品は服用しないで下さい。
- (6) 水分が錠剤に付着しますと、表面の一部が溶けて白い斑点を生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手でふれないで下さい。



〔便秘しがちな方のために〕

- (1) 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、時間をきめて一定時間トイレに入るよう心がけて下さい。
また、便意をもよおしたときは、がまんせずトイレに行ってください。
- (2) 繊維質の多い食物と水分を多くとるように心がけて下さい。
(例:野菜類、果物、コンニャク、カンテン、海藻など)
- (3) 適度な運動、腹部マッサージなどを行うよう心がけて下さい。
- (4) 早朝、起きがけに冷たい水または牛乳等を飲むと便意をもよおしやすくなります。



お問い合わせ先

小林薬品工業株式会社 お客様相談室 電話 058(278)3933
受付時間 10時から16時まで (土、日、祝日を除く)

製造販売元

本社所在地

小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中鶉1丁目139番地
東京都中央区日本橋箱崎町40番6号